Клинические, генетические и радионуклидные характеристики пациентов с фокальной формой врожденного гиперинсулинизма

© Д.Н. Губаева^{1*}, М.А. Меликян¹, Д.В. Рыжкова², М.Д. Пойда², В.Г. Баиров², А.А. Сухоцкая², Ю.Ю. Соколов³, А.М. Ефременков³, Л.Б. Митрофанова², Н. Christesen⁴, И.Л. Никитина²

¹Национальный медицинский исследовательский центр эндокринологии, Москва, Россия;

²Национальный медицинский исследовательский центр им. В.А. Алмазова, Санкт-Петербург, Россия;

³Российская медицинская академия непрерывного профессионального образования, Москва, Россия;

⁴Университетская клиника города Оденс, Оденс, Дания

Обоснование. Врожденный гиперинсулинизм (ВГИ) является тяжелым заболеванием с высоким риском развития осложнений в виде неврологического дефицита. Персистирующие гипогликемии при фокальной форме ВГИ в 96,4% не купируются медикаментозной терапией, что приводит к необходимости оперативного лечения. В настоящий момент имеется дефицит информации касательно характеристик российской популяции пациентов с фокальной формой ВГИ. Исследование данной группы пациентов направлено на поиск возможностей оптимизации диагностики и лечения.

Цель: изучение клинических, молекулярно-генетических и радионуклидных особенностей фокальной формы врожденного гиперинсулинизма в российской группе пациентов.

Методы. В данное наблюдательное исследование были включены все пациенты с гистологически подтвержденной фокальной формой ВГИ, поступившие в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» с января 2008 г. по январь 2019 г. Был проведен статистический анализ имеющихся клинических, молекулярно-генетических данных и результатов позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с ¹⁸F-дигидроксифенилаланином (¹⁸F-ДОФА). Медиана продолжительности наблюдения составила 18 мес.

Результаты. В исследование был включен 31 пациент с фокальной формой ВГИ (14 (45,2%) мальчиков). У всех пациентов отмечалась неонатальная манифестация заболевания с высокой потребностью в непрерывной инфузии глюкозы для поддержания эугликемии. Разница между возрастом манифестации гипогликемии и возрастом постановки диагноза колебалась от 1 дня до 3,9 месяцев. Во всех случаях было констатировано диазоксид резистентное течение заболевания. Тем не менее, у 9 пациентов удалось отменить непрерывную терапию глюкозой и поддерживать относительную эугликемию при применении октреотида в предоперационном периоде. Проведение молекулярно-генетического исследования позволило обнаружить различные варианты мутаций в генах *ABCC8* и *KCNJ11* у 30 пациентов. Показатели панкреатического индекса (ПИ) по данным ПЭТ с ¹⁸F-ДОФА колебались в широких пределах – от 1,16 до 3,59. После частичной резекции участка поджелудочной железы с гиперсекрецией инсулина у всех пациентов наблюдалось полное выздоровление.

Заключение. Фокальная форма ВГИ имеет тяжелое течение с высоким процентом развития неврологических осложнений. Для предоперационной диагностики формы заболевания необходимо проведение молекулярно-генетического и радионуклидного исследований. Исключительная оценка математических параметров при проведении ПЭТ с ¹⁸F-ДОФА без учета визуальных данных и результатов молекулярно-генетического исследования не позволяет однозначно установить диагноз. Важными задачами представляются своевременная диагностика и лечение заболевания, а также определение факторов риска и профилактика осложнений персистирующей гипогликемии.

Ключевые слова: врожденный гиперинсулинизм, гипогликемия, ПЭТ, ¹⁸F-ДОФА

Clinical, genetic, and radionuclide characteristics of the focal form of congenital hyperinsulinism

© Diliara N. Gubaeva^{1*}, Maria A. Melikyan¹, Daria V. Ryzhkova², Mikhail D. Poyda², Vladimir G. Bairov², Anna A. Sukhotskaya², Yuriy Yu. Sokolov³, A.M. Efremenko³, Lubov B. Mitrofanova², Henrik Christesen⁴, Irina L. Nikitina²

¹Endocrinology Research Centre, Moscow, Russia;

²Almazov National Medical Research Centre, St. Petersburg, Russia;

³Russian Medical Academy of Postgraduate Education, Moscow, Russia;

⁴Odense University Hospital, Odense, Denmark

BACKGROUND: Congenital hyperinsulinism (CHI) is a severe disease with a high risk of complications including neurological deficit. Persistent hypoglycemia in patients with focal form of CHI can not be managed with medical treatment in 96.4% of cases, what subsequently leads to surgical treatment. Currently, there is a lack of information regarding patients with focal form of CHI. This study is aimed at finding better approaches for diagnosis and treatment of patients with focal form of CHI.

AIMS: To study clinical, genetic and PET/CT findings of the focal form of CHI in Russian group of patients.

MATERIALS AND METHODS: The observational research included all patients with a histologically confirmed focal form of CHI, who were admitted to Endocrinology Research Centre during the period from January 2008 to January 2019. A statistical analysis of clinical data, genotype, and positron emission tomography (PET) with ¹⁸F-dihydroxyphenylalanine (¹⁸F-DOPA) was performed. The median follow-up was 18 months.

RESULTS: The study included 31 patients with focal CHI (14 boys, 45.2%). All patients had a neonatal presentation of the disease and demanded high levels of continuous glucose infusion to maintain euglycemia. The difference between the age of hypoglycemia presentation and the age of diagnosis ranged from 1 day to 3.9 months. In all cases, diazoxide was found to be ineffective. However, in 9 patients, it was possible to withdraw continuous glucose infusion and maintain euglycemia using octreotide in the preoperative period. A molecular genetic study allowed us to detect diverse pathogenic variants in *ABCC8* and *KCNJ11* genes in 30 patients. According to PET data with ¹⁸F-DOPA, the pancreatic index (PI) varied widely from 1.16 to 3.59. After partial resection of the pancreatic region with insulin hypersecretion, all patients showed complete recovery.

CONCLUSIONS: The focal form of CHI is a severe condition with high prevalence of neurological complications. For preoperative diagnosis of the morphological form of the disease, it is necessary to conduct genetic analysis and radionuclide studies. Solely evaluation of mathematical parameters in ^{18}F -DOPA PET without taking into account the visual data and the results of genetic analysis does not allow establishing the robust diagnosis. Timely diagnosis, identification of risk factors, and prevention of complications of persistent hypoglycemia are important tasks for clinicians.

Keywords: Congenital hyperinsulinism, hypoglycemia, ^{18}F -DOPA, PET.

Обоснование

Врожденный гиперинсулинизм (ВГИ) является одной из частых причин гипогликемии в детском возрасте [1]. Основой данного заболевания является неадекватная гиперсекреция инсулина β -клетками поджелудочной железы вследствие генетического дефекта. Распространенность ВГИ составляет, по данным мировой литературы [2], 1:30 000 новорожденных. Клиническая картина ВГИ неспецифична и обусловлена гипогликемией. Персистирующая гипогликемия в детском возрасте может приводить к задержке психомоторного развития, эпилепсии, слепоте и другим неврологическим нарушениям, что обуславливает необходимость ранней диагностики и своевременной терапии ВГИ.

Существует две основные морфологические формы ВГИ: диффузная и фокальная. Знания о наличии той или иной морфологической формы заболевания у пациента необходимы для прогнозирования клинической картины и, соответственно, выбора тактики ведения. Развитие диффузной либо фокальной формы ВГИ определяется генетическим дефектом. В настоящее время известно 14 генов (*ABCC8*, *KCNJ11*, *GLUD1*, *GCK*, *HADH*, *SLC16A1*, *UCP2*, *HNF4A*, *HNF1A*, *HK1*, *PGM1*, *PMM2*, *SACNA1D*, *FOXA2*), мутации в которых приводят к развитию ВГИ [3]. По данным исследований, наиболее часто развитие ВГИ обусловлено патогенными мутациями в генах, ответственных за работу АТФ-зависимых калиевых каналов, — *ABCC8* и *KCNJ11* [4]. Так, при наличии патогенной мутации во всех β -клетках поджелудочной железы возникает диффузная форма ВГИ. Напротив, фокальная форма заболевания возникает при наследовании патогенной мутации на отцовской аллели в генах *ABCC8* или *KCNJ11* с одновременной соматической потерей материнской аллели в области 11p15. Следует подчеркнуть, что основой развития фокальной формы ВГИ является не новообразование, а группа β -клеток с генетически детерминированной гиперсекрецией инсулина.

Известно, что диффузная форма в большинстве случаев поддается медикаментозной терапии [4]. Для лечения заболевания наиболее широко используются такие препараты, как диазоксид и октреотид. Однако в случае фармакорезистентного течения диффузной формы возникает необходимость в проведении субтотальной панкреатэктомии, что является инвалидизирующей операцией, приводящей к экзокринной и эндокринной недостаточности поджелудочной железы. Особенность фокальной формы — не-

эффективность инсулиностатических препаратов у подавляющего большинства пациентов [5, 6]. Предпочтительной тактикой лечения у пациентов с фокальной формой ВГИ является проведение резекции участка гиперпродукции инсулина с сохранением интактной ткани поджелудочной железы, что позволяет излечить заболевание и полностью сохранить функцию органа.

Заподозрить фокальную форму помогают молекулярно-генетические исследования. Единственным доступным неинвазивным методом топической предоперационной диагностики морфологической формы ВГИ остается проведение позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ) с радиофармацевтическим препаратом ^{18}F -дигидроксифенилаланином (^{18}F -ДОФА) [1, 7]. Использование других методов визуализации (УЗИ, магнитно-резонансная томография, компьютерная томография (КТ) с контрастированием, ПЭТ с ^{18}F -фтордезоксиглюкозой) не позволяет определить форму заболевания. Применение ПЭТ с ^{18}F -ДОФА и одновременное использование КТ дают возможность не только провести дифференциальную диагностику между формами заболевания, но и определить локализацию очага гиперсекреции инсулина в ткани поджелудочной железы при фокальной форме ВГИ.

В настоящее время имеется дефицит данных относительно особенностей клинического течения и диагностики у пациентов с фокальной формой ВГИ в российской популяции. Представляется необходимым расширенное исследование данной группы пациентов, включая клиническую картину, выявление спектра патогенных и частых мутаций, характерных для российской популяции, определение радионуклидных характеристик и особенностей фокальной формы ВГИ.

Цель

Определение клинических, молекулярно-генетических и радионуклидных характеристик фокальной формы врожденного гиперинсулинизма в российской группе пациентов.

Методы

Дизайн исследования

В наблюдательное одномоментное многоцентровое сплошное исследование с ретроспективным ком-

понентом были включены пациенты с доказанной фокальной формой ВГИ.

Критерии соответствия

Для участия в исследовании из базы данных пациентов НМИЦ эндокринологии были отобраны и приглашены все пациенты с врожденным гиперинсулинизмом (их законные представители), находившиеся под наблюдением с января 2008 г. по январь 2019 г.

Критерии включения: возраст на момент обследования менее 18 лет; наличие гипокетотической гипогликемии с повышенной концентрацией инсулина; гистологически подтвержденная фокальная форма ВГИ.

Для оценки причины гипогликемических состояний выполнялась проба с голоданием, в момент определения гипогликемии менее 3,0 ммоль/л по капиллярной крови у пациентов пунктировалась периферическая вена и выполнялся забор венозной крови для определения биохимических параметров (глюкоза, кетоны, печеночные ферменты, лактат) и проведения гормональных исследований (инсулин, С-пептид). При наличии повышенной секреции инсулина (более 2,0 мМЕ/мл) на фоне гипогликемии (менее 3,0 ммоль/л) и гипокетонемии (менее 1,0 ммоль/л) устанавливался диагноз органического гиперинсулинизма.

Критерии исключения: отсутствие гистологического заключения послеоперационных препаратов; отсутствие согласия пациентов/родителей пациентов на участие в исследовании.

Условия проведения

Клиническое, биохимическое и гормональное исследования проводились в ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» (Москва, Россия) и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (г. Санкт-Петербург, Россия). С 2008 по 2017 г. ПЭТ пациентам проводилась в Дании, с 2017 года исследование проводилось в России.

Продолжительность исследования

Исследование проведено в 2019 г. и включает анализ клинических и лабораторно-инструментальных данных пациентов, обследованных за период с 2008 по 2019 гг. Все участники исследования были обследованы во время постановки диагноза и после операции.

Описание медицинского вмешательства

Для анализа использованы данные историй болезни. Все медицинские вмешательства проводились вне исследования в рамках рутинной клинической практики по актуальным на соответствующий момент времени международным стандартам и строго при наличии показаний у каждого конкретного пациента.

Исходы исследования

Конечными точками исследования являлись разность между возрастом манифестации и возрастом постановки диагноза, частота фармакорезистентных случаев среди пациентов с фокальными формами ВГИ, встречаемость аллельных вариантов генов *ABCC8* и *KCNJ11* в исследуемой выборке, а также значение панкреатического индекса при проведении ПЭТ с ^{18}F -ДОФА.

Методы регистрации исходов

Молекулярно-генетический анализ крови пациентов выполнен в лаборатории наследственных эндокринопатий ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» (Москва, Россия). У большей части пациентов (21 ребенок) было проведено секвенирование нового поколения панели генов *GCG*, *GLUD1*, *WFS1*, *HNFI1A*, *GCK*, *INS*, *HNFI1B*, *ABCC8*, *HNFI4A*, *RFX6*, *PTFI1A*, *NEUROD1*, *AKT2*, *ZFP57*, *INSR*, *EIF2AK3*, *PPARG*, *PAX4*, *PDX1*, *GLIS3*, *KCNJ11*, *SLC16A1*, *FOXP3*, *BLK*, *CEL*, *KLF11*, *SCHAD* и *GCGR* на платформе Ion Torrent. У 10 пациентов молекулярно-генетический анализ генов *ABCC8*, *KCNJ11* и *GLUD1* проводился методом Сэнгера. Выбор того или иного метода молекулярно-генетического исследования обусловлен доступностью определенной технологии на момент обследования пациентов. В 26 случаях также проводилось исследование искомой мутации у родителей пациентов методом прямого секвенирования.

ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА выполнено 25 пациентам: 14 — на базе научно-исследовательского отдела ядерной медицины и тераностики ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова» (Санкт-Петербург, Россия), 11 — на базе Университетской клиники г. Оденс (Оденс, Дания).

До исследования проводилась подготовка пациентов в стационаре, минимум за 48 ч до процедуры отменялась терапия инсулиностатическими препаратами (диазоксид, соматостатин, глюкагон). Исследование проводилось под общим наркозом с использованием пропофола. ПЭТ/КТ выполнялась на совмещенной системе Discovery 710 (General Electric). Доза вводимого радиоизотопа рассчитывалась по формуле 4 МБк на 1 кг массы тела пациента. Регистрация данных ПЭТ и КТ проводилась в следующие отрезки времени в зависимости от момента введения ^{18}F -ДОФА: 10–20, 20–40, 40–50 и 50–60 мин. Оценку ПЭТ изображений осуществляли в режиме 3D-реконструкции. Расчет панкреатического индекса (ПИ) производили по формуле: отношение максимального значения стандартизированного показателя накопления радиофармпрепарата (SUV_{max}) в патологическом фокусе ^{18}F -ДОФА к следующему максимальному по значению показателю SUV в другом участке поджелудочной железы.

После проведения хирургического вмешательства у всех пациентов было выполнено морфологи-

ческое исследование ткани поджелудочной железы по стандартному протоколу дифференциальной диагностики морфологических форм ВГИ. Подготовка к операции, хирургическое лечение, гистологическое исследование, послеоперационное ведение проводились на базах ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова», Университетской клиники г. Оденс (Дания), РДКБ, ДГКБ им. З.А. Башляевой.

Этическая экспертиза

Проведение исследования было одобрено локальным этическим комитетом ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» МЗ РФ (протокол №18 от 11.10.17). Информированное согласие на проведение исследования и обработку данных было подписано законными представителями участников исследования.

Статистический анализ

Для анализа данных использовали программу Statistica 10 («StatSoft», США). Предварительного расчета размера выборки не проводилось. В ходе расчетов использовались проценты, медиана и интерквартильный размах.

Результаты

Объекты (участники) исследования

Всего за период с января 2008 г. по январь 2019 г. в Институте детской эндокринологии ФГБУ «НМИЦ эндокринологии» был выявлен 241 пациент с ВГИ. Из них у 32 была диагностирована фокальная форма заболевания, однако у одного из детей отсутствовало достоверное гистологическое заключение, поэтому данный пациент был исключен из исследования. Таким образом, группу исследования составил 31 пациент с доказанной фокальной формой ВГИ. У всех пациентов на фоне пробы с голоданием была зафиксирована гипокетотическая гипогликемия с повышенной концентрацией инсулина. Гистологическое исследование послеоперационного материала тканей поджелудочной железы подтвердило наличие фокальной формы заболевания. Медиана возраста пациентов на момент обследования составила 1 мес,

медиана продолжительности наблюдения – 18 мес. В качестве медикаментозной инсулиностатической терапии до определения морфологической формы заболевания 22 пациента получали диазоксид в средней терапевтической дозе не менее 3 дней; 25 пациентов получали октреотид в средней терапевтической дозе не менее 1 сут.

Основные результаты исследования

С целью достижения эугликемии до момента определения морфологической формы ВГИ, помимо внутривенного введения растворов глюкозы, пациентам проводилась инсулиностатическая терапия (диазоксид 19/31, октреотид 31/31). Медиана максимальной дозы диазоксиды составила 14,9 кг/кг/сут [12,8;15,6]. Медиана суточной дозы октреотида составила 13,7 мкг/кг [8,0;20,0]. Терапия диазоксидом была отменена у всех получавших его пациентов в связи с отсутствием положительного эффекта (17/19) либо из-за развития таких побочных эффектов, как отеки, анорексия, рвота (2/19). Применение октреотида оказалось более успешным: у 9/31 (29,0%) пациентов удалось достигнуть субкомпенсации заболевания без внутривенной дотации глюкозой. У 1 пациента сохранялись приемлемые показатели гликемии на фоне частого дробного кормления, терапия диазоксидом оказалась неэффективной, попытку лечения октреотидом не проводили.

У всех пациентов, кроме одного, отмечались неонатальная манифестация заболевания и потребность во внутривенной дотации растворами глюкозы для поддержания эугликемии (табл. 1).

В большинстве случаев причиной развития ВГИ у детей с фокальной формой ВГИ являлись гетерозиготные мутации в гене *ABCC8* (27/31). Всего было выявлено 22 различные мутации, 13 из которых ранее не были описаны в литературе.

Обследование родителей пробандов было возможно в 22 из 27 семей. Во всех случаях мутации были наследованы от отца.

Патогенные мутации в гене *KCNJ11* были обнаружены у 6/31 пациентов. Данные мутации были унаследованы по отцовской линии, один вариант ранее не был описан в литературе.

Таблица 1. Клинические характеристики пациентов с фокальной формой ВГИ (n=31)

Характеристика	Медиана [Q25; Q75]
Возраст манифестации, дни	2 [1; 3]
Возраст постановки диагноза, дни	2 [14; 30]
Разница между возрастом манифестации и постановки диагноза, дни	14 [12; 32]
SDS веса при рождении по отношению к сроку гестации	1,0 [0,06; 1,99]
Минимальная зафиксированная гликемия, ммоль/л	0,9 [0,7; 1,4]
Инсулин плазмы на фоне гипогликемии, Ед/л	15,5 [8,9; 28,1]
Скорость утилизации в/в вводимой глюкозы до достижения эугликемии, мг/кг/мин	12,3 [8,7; 15,0]

Рис. 1. Схематическое расположение фокусов у пациентов с фокальной формой ВГИ (n=24).

В большинстве случаев (13/24) локализация участка повышенного синтеза инсулина располагалась в головке поджелудочной железы. У 1 пациента фокус располагался на границе головки и тела, у 3 – в теле, у 4 – в хвосте поджелудочной железы. Гигантский фокус визуализировался у 1 пациента (пациент 14). Эктопическое расположение фокуса в стенке двенадцатиперстной кишки было выявлено у пациента 31.

У одного пациента не было выявлено наличия патогенных мутаций. Данному ребенку проводилось исследование генов *ABCC8*, *KCNJ11* и *GLUD1* методом Сэнгера.

В семьях пробандов не отмечалось близкородственных браков и отягощенного наследственного анамнеза по ВГИ.

По результатам ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА с оценкой визуальных и расчетных данных у всех пациентов была диагностирована фокальная форма ВГИ. Медиана возраста проведения процедуры составила 4 мес. Размеры фокусов гиперсекреции инсулина колебались от 7 до 21,5 мм. Информация о расположении фокуса была доступна у 24/25 пациентов (рис. 1). Основные результаты исследования представлены в табл. 2.

Информация для расчета ПИ была доступна у 14 пациентов. При этом максимальное значение данного параметра широко варьировало – от 1,16 до 3,59, медиана значения ПИ составила 1,76 [1,4; 2,0]. Визуально у всех пациентов определялся повышенный захват изотопа в локусе гиперпродукции инсулина.

Обсуждение

По результатам исследования, за 11-летний период был выявлен 31 пациент с доказанной фокаль-

ной формой ВГИ, что составило 12,8% от общего числа пациентов. Формирование кластера клеток с неадекватной гиперсекрецией инсулина у пациентов с фокальной формой ВГИ возможно за счет совокупности двух патогенетических механизмов (рис. 2). Первый механизм включает появление мутации на отцовской аллели в хромосомальной области 11p15.1, содержащей гены *KCNJ11* и *ABCC8* [4]. Второй механизм представляет собой потерю здорового участка 11p15 на материнской аллели, что в совокупности ведет к формированию гомозиготной мутации в искомой клетке. Более того, вследствие данных изменений развивается дисбаланс в системе пролиферации клеток. На материнской аллели описанного участка располагаются гены, подавляющие деление клеток (*H19* и *CDKN1C*). В то время как на отцовской аллели расположен ген, стимулирующий деление клеток *IGF2*. Таким образом, происходит избыточная пролиферация клеток с отцовской изодисомией и мутацией в генах, ответственных за функционирование АТФ-зависимых калиевых каналов, что и формирует гиперинсулинемический фокус [8].

За исключением одного случая, у всех пациентов было выявлено наличие патогенной мутации в генах, ответственных за развитие АТФ-зависимых калиевых каналов. Данные мутации у пациентов с фокальной формой ВГИ могут наследоваться от отца либо возникать *de novo* на отцовской аллели. Отсутствие мутации у пациента 19 может быть связано с неполным покрытием в рамках проведения генетического исследования, погрешностями метода или наличием мутации в интронной области.

В целом в ходе исследования было обнаружено 13 ранее не описанных мутаций в гене *ABCC8* (с.1923+2Т>А, с.Г1705С: р.А569Р, с.2691С>Г: р. D897Е, с.Т3629С: р. L1210Р, с.1332+1delG, с.С2113Т: р. R705Х, с.3324dupC: р. M1109fs, с.А680G: р. E227G, с.3330-13G>А, с.4575+1G>С, с.3557+1G>А, с.1038С>G: р. Y344Х, с.С4059А: р. Y1353Х). Также стоит обратить внимание на выявление идентичных мутаций в группе неродственных пациентов. У 4 российских пациентов отмечалось наличие патогенной мутации с.1332G>Т: р. Q444Н в гене *ABCC8* (мутация ранее описана в литературе у евро-

Рис. 2. Схематическое изображение генетических механизмов, обуславливающих формирование фокуса гиперинсулинизма.

Таблица 2. Основные данные пациентов с фокальной формой ВГИ

№ пациента	Пол	Возраст манифестации, дни	Гетерозиготные патогенные мутации	Размер фокуса по ПЭТ	Расположение фокуса	ПИ на 10–20′	ПИ на 20–40′	ПИ на 40–50′	ПИ на 50–60′	Терапия до опера- ции	Возраст операции, операция,	Возраст и терапия на настоящий момент
1	ж	2	gABCC8 c.G1332T:p.Q444N	12×12×10	г	2,66	3,18	—	3,59	диета+октр	5 мес, резекция фокуса	1 год 10 мес, нд
2	ж	1	*ABCC8 с 1923+2T>A	12,8×15,56×22	г	2,55	2,55	2,76	2,97	глюк+октр	4 мес, резекция фокуса	1 год 9 мес, б/т
3	ж	3	**ABCC8 с.1032C>G; p.Y344X	8,3×10,0×11,0	г	2,34	2,63	2,62	2,58	глюк+октр	2 мес, резекция фокуса	4 мес, б/т
4			**KCNJ11									
5	м	6	с.1096G>A; p.G366R	9,4×10,0×12,4	г	1,82	2,01	1,87	2,05	диета+октр	3 мес, резекция фокуса	1 год 10 мес, б/т
6	м	1	*ABCC8 с.G1705C; p.A569P	10,7×8,9×7,7	г	1,84	1,96	1,83	2,04	октр	4 мес, резекция фокуса	7 мес., б/т
7	ж	1	с.560C>T; p.A187V	13,6	т	1,59	1,68	1,86	1,85	глюк+октр	нд, резекция фокуса	1 год 4 мес, б/т
8	м	2	*ABCC8 с.2691C>G; p.D897E	11×10,4×11	г	1,66	1,66	1,77	1,80	октр	6 мес, резекция фокуса	2 года, б/т
9	м	2	с.Т3629C; p.L1210P	нд	г	—	1,68	1,65	1,73	глюк+октр	4 мес, резекция фокуса	2 года 4 мес, диета
10	ж	1	*ABCC8 с.1332+1delG	нд	х	1,39	1,59	—	—	диаз+октр	7 мес, резекция фокуса	2 года 6 мес, б/т
11	ж	3	с.C2113T; p.R705X	11,9×12×9,3	г	1,26	1,33	1,44	1,40	диета+октр	2 мес, резекция фокуса	1 год 9 мес, нд
12	ж	1	с.2521C>T; p.R841X	13,2×11,4×12,9	г	1,24	1,41	1,37	1,40	диета+октр	12 мес, резекция фокуса	1 год 11 мес, б/т
13	м	3	*ABCC8 с.3324dupC; p. M1109fs	12,3×9,6×9,7	т	1,12	1,25	1,14	1,16	диета+октр	1 год 10 мес, резекция фокуса	3 года 3 мес, б/т
14	ж	2	с.A680G; p.E227G	8,2×7,1×6,0	г+т	1,10	1,16	1,16	1,08	диета+октр	12 мес, резекция фокуса	2 года 5 мес, диета
15	м	1	с.C4306G; p.R1436G	46,5×21,5×20	мультифокус	1,06	1,01	1,12	1,16	диета	5 мес, резекция фокуса	1 год 9 мес, б/т
16	м	2	*ABCC8 с.3330-13G>A	не делали	не делали					глюк	1 мес, с/т ПЭ	9 лет 5 мес, инсулин
17	м	2	с.2522G>C; p.R841P	не делали	не делали					нд	2 мес, с/т ПЭ	9 лет 10 мес, б/т
18	ж	3	KCNJ11 с.400msG; p.R136AFsX5	7	х					глюк+октр	1 мес, резекция фокуса	5 лет, б/т
			*ABCC8 с.4575+1G>C									

Таблица 2. Основные данные пациентов с фокальной формой ВГИ (окончание)

№ пациента	Пол	Возраст манифестации, дни	Гетерозиготные патогенные мутации	Размер фокуса по ПЭТ	Расположение фокуса	ПИ на 10–20'	ПИ на 20–40'	ПИ на 40–50'	ПИ на 50–60'	Терапия до операции	Возраст операции, операция	Возраст и терапия на настоящий момент
19	ж	3	^δ ABCC8 с. G1332T; р. Q444H	нд	нд	нд				нд	4 мес, резекция фокуса	8 лет 10 мес, б/т
20	м	2	—	не делали	не делали	не делали				нд	2 мес, с/т ПЭ	11 лет 2 мес, б/т
21	м	3	ABCC8 с. C3640T; р. R1215W	не делали	не делали	не делали				глюк	5 мес, с/т ПЭ	8 лет 5 мес, инсулин
22	ж	3	ABCC8 с. C4238T; р. P1413L	нд	нд	х				глюк+октр	4 мес, резекция фокуса	3 года 3 мес, б/т
23	ж	1	ABCC8 с. C4477T; р. R1493W	нд	нд	нд				диета+октр	Нд, резекция фокуса	4 года 1 мес, б/т
24	ж	2	**ABCC8 с. 1038C > G; р. Y344X	7	г	г				глюк+октр	3 мес, резекция фокуса	2 года 5 мес, б/т
25			**KCNJ11 с. 1096G > A; р. G366R									
26	м	90	KCNJ11 с. C761T; р. P254L	нд	г	г				октр	2 года 6 мес, резекция фокуса	6 лет 8 мес, б/т
27	ж	3	ABCC8 с. G4411A; р. D1472N	нд	г	г				октр	2 года 4 мес, резекция фокуса	8 лет 3 мес, б/т
28	м	1	ABCC8 с. 3992-9G > A	6×8×5	х	х				диета+октр	1 год 9 мес, резекция фокуса	7 лет 6 мес, б/т
29	м	1	*ABCC8 с. 3557+1G > A	8	г	г				глюк+октр	3 мес, резекция фокуса	3 года 5 мес, б/т
30	ж	1	^δ ABCC8 с. G1332T; р. Q444H	2×4×7	т	т				глюк+октр	3 мес, резекция фокуса	3 года 8 мес, б/т
31	ж	1	**ABCC8 с. 1038C > G; р. Y344X	не делали	не делали	не делали				глюк	1 год 6 мес., с/т ПЭ	8 лет 11 мес, б/т
32			**KCNJ11 с. 1096G > A; р. G366R									
33	м	1	^δ ABCC8 с. G1332T; р. Q444H	не делали	не делали	не делали				глюк	3 мес, с/т ПЭ	15 лет 9 мес, инсулин
34	ж	3	*ABCC8 с. C4059A; р. Y1353X	нд	Эктопированный в 12пк	Эктопированный в 12пк				октр	1 год 6 мес, резекция фокуса	4 года 9 мес, б/т

Примечание: * – не описанная мутация; 12пк – двенадцатиперстная кишка; ПИ – панкреатический индекс; мес – месяц; м – мужской пол; ж – женский; нд – нет данных; г – головка поджелудочной железы; т – тело поджелудочной железы; х – хвост поджелудочной железы; диета – кормление каждые 2–4 ч; октр – применение октреотида; глюк – применение внутривенной; инфузии растворов глюкозы; б/т – без терапии; инсулин – инсулинотерапия; с/т ПЭ – субтотальная панкреатэктомия; # – обозначение идентичных мутаций; ^δ – обозначение идентичных мутаций; полужирным выделено максимальное значение ПИ.

пейских пациентов с фокальной формой ВГИ) [9]. Более того, у 3 неродственных пациентов было выявлено сочетание нонсенс мутации с.1038C>G: p.Y344X в гене *ABCC8* и вероятно патогенной мутации с.1096G>A, p.G366R в гене *KCNJ11* на одной аллели. Также стоит отметить, что по отдельности данные варианты нами выявлены не были. На настоящий момент такое сочетание описано только у российских пациентов, что может быть вызвано эффектом основателя [10].

Клиническая картина заболевания в группе пациентов с фокальной формой ВГИ отличалась тяжестью течения. Основными особенностями фокальной формы заболевания являлись неонатальная манифестация и потребность в высоких дозах глюкозы для поддержания эугликемии. Полученные результаты согласуются с данными зарубежной литературы [5, 6]. Также у большинства пациентов при рождении отмечалась крупная масса тела по отношению к гестационному возрасту (медиана SDS массы тела 1,0). Возраст постановки корректного диагноза значительно отличался от возраста манифестации, медиана задержки в постановке диагноза составила 14 дней. Связь между персистирующей гипогликемией и наличием неврологических осложнений неоднократно была установлена в других исследованиях [11, 12]. Для профилактики неврологических осложнений рекомендуется раннее выявление пациентов с ВГИ и незамедлительное начало терапии, направленной на поддержание эугликемии [13, 14].

Как правило, у пациентов с фокальной формой ВГИ отмечается отсутствие положительного эффекта от инсулиностатической терапии, хотя у части удается добиться эугликемии на фоне терапии октреотидом [5,6]. Также опубликованы единичные случаи диазоксид-чувствительного течения фокальной формы ВГИ [15–17]. В нашей выборке применение диазоксида либо оказалось неэффективным, либо было прервано из-за побочных эффектов у всех получавших его пациентов. Следует отметить, что почти у $1/3$ пациентов с фокальной формой ВГИ был получен положительный ответ на фоне терапии октреотидом.

Учитывая принципиальные различия в объеме оперативного вмешательства, пациентам с фармкорезистентным течением ВГИ показано проведение ПЭТ с ^{18}F -ДОФА. Визуализация поджелудочной железы происходит за счет захвата островковыми клетками радиоизотопа [18, 19]. В мировой литературе предлагается применение математического показателя ПИ для оценки результатов ПЭТ. При значении ПИ более 1,5 устанавливается фокальная форма, при значении ПИ менее 1,3 диагностируется диффузная форма ВГИ [20]. Однако на практике существуют определенные затруднения при применении данного параметра для дифференциальной диагностики морфологических форм. В нашем исследовании, несмотря на гистологически подтвержденную фокаль-

ную форму, у $1/3$ пациентов значение ПИ было менее 1,5. Фокальная форма ВГИ по результатам ПЭТ у данной группы пациентов была предположена исходя из визуальных данных (рис. 3). Значение ПИ было максимальным в промежутках через 20–60 мин после введения радиоизотопа. Таким образом, вызывает сомнения необходимость проведения сканирования через 10 мин после исследования. Затруднения в применении ПИ могут возникнуть за счет физиологического повышенного захвата ^{18}F -ДОФА в области головки поджелудочной железы, при оценке гигантских фокусов или мультифокусов [21, 22].

Стоит отметить, что у 54% пациентов фокусы гиперсекреции инсулина располагались в области головки поджелудочной железы, что отмечено и другими группами исследователей [17, 23]. Однако причины преобладающего расположения фокуса ВГИ именно в этой части органа остаются неясными. Более того, обнаружено, что количество островков Лангерганса у взрослых пациентов в 2 раза больше в области хвоста поджелудочной железы по сравнению с головкой и телом [24]. Наиболее вероятно, что определенную роль в возникновении очага гиперпродукции инсулина играют особенности эмбриогенеза, пролиферации и гистологического строения поджелудочной железы в неонатальном возрасте.

В исследуемой группе пациентов у 1 ребенка (пациент 14) визуализировался гигантский очаг повышенного захвата при проведении ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА. Позднее, по результатам гистологического исследования, была установлена мультифокальная форма ВГИ. Также представляет интерес тот факт, что этот пациент имел относительную компенсацию заболевания на фоне дробного кормления без применения медикаментозной терапии.

У 1 (пациент 31) диагностировано эктопическое расположение фокуса гиперинсулинизма в двенадцатиперстной кишке. Данное наблюдение не удивительно, учитывая эмбриогенетическую связь поджелудочной железы с двенадцатиперстной кишкой. В целом мультифокальное и эктопическое расположение фокусов у пациентов с ВГИ встречается достаточно редко [21, 22].

Несмотря на относительную эугликемию у части больных на фоне лечения октреотидом или диетотерапии, всем пациентам было проведено хирургическое вмешательство. Показания к оперативному лечению были обусловлены высоким риском развития гипогликемии на фоне пропуска приема пищи, тахифилаксией при применении октреотида, а также возможностью полного излечения после проведения резекции фокуса [23]. Большей части (25/31) детей выполнена резекция участка аденоматоза с проведением интраоперационной гистологической диагностики для оценки края иссечения (рис. 4). Проведение субтотальной панкреатэктомии пациентам с фокальной формой ВГИ было связано с отсутствием возможно-

сти проведения полной предоперационной диагностики, в частности ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА на момент обследования.

В подавляющем большинстве случаев в послеоперационном периоде у пациентов сохранялась эугликемия на фоне обычного режима питания, у 3 детей после проведения субтотальной панкреатэктомии развились инсулинопотребный сахарный диабет и экзокринная недостаточность поджелудочной железы, 2 пациента нуждались в частом кормлении после проведения резекции фокуса ВГИ. У пациента 8 в послеоперационном периоде сохранялись гипогликемические состояния в течение 1 года, потребовавшие применения непрерывного подкожного введения октреотида. При последующем обследовании в 1 год 4 мес у него была констатирована ремиссия ВГИ и наличие кетотических гипогликемий, что потребовало частого кормления и введения в рацион кукурузного крахмала. У пациента 13 после проведения оперативного лечения зафиксированы гипогликемические состояния, исключена неадекватная гиперсекреция инсулина, однако генез гипогликемических состояний остается неясным. В настоящий момент пациенту 13 рекомендовано кормление по требованию в течение дня и прием кукурузного крахмала на ночь.

Ограничения исследования

Основным ограничением данного исследования являлось малое число пациентов в связи с невысокой распространенностью заболевания.

Заключение

Фокальная форма ВГИ характеризуется тяжелым течением заболевания. Задержка в постановке диагноза и начале терапии у пациентов с фокальной формой ВГИ, по данным исследования, составляет примерно 2 нед. Применение медикаментозной инсулиностатической терапии не эффективно у большинства пациентов, и основным методом лечения фокальной формы ВГИ является проведение резекции участка гиперпродукции инсулина. При анализе данных ПЭТ с ^{18}F -ДОФА стоит принимать во внимание как расчетные, так и визуальные данные, а также помнить о возможности эктопии, гигантских фокусов и множественных очагов. Применение предоперационной дифференциальной диагностики с использованием молекулярно-генетического анализа и ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА позволило избежать субтоталь-

ной панкреатэктомии и ее последствий у пациентов с фокальной формой ВГИ. В течение последних 2 лет дети с данной патологией начали получать полный цикл лечения в нашей стране (ФГБУ «НМИЦ эндокринологии», ФГБУ «НМИЦ им. В. А. Алмазова»). Актуальными проблемами в данной области остаются сокращение периода персистирующей гипогликемии за счет своевременной диагностики ВГИ, определение факторов риска и профилактика осложнений заболевания, разработка доступных методов дифференциальной диагностики с возможностью определения объективных параметров.

Дополнительная информация

Дополнительные материалы к статье

Рис. 3. Результаты ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА у пациентов с различными морфологическими формами ВГИ.

а — диффузная форма ВГИ. Захват ^{18}F -ДОФА равномерен; б — фокальная форма ВГИ. Визуализируется очаг накопления радиофармпрепарата; в — эктопическая локализация фокальной формы ВГИ. Очаг накопления радиоизотопа визуализируется в области двенадцатиперстной кишки.

Доступен на цветной вкладке и в сети Интернет:

<https://doi.org/10.14341/probl10317-4766>

Рис. 4. Гистологическое исследование ткани поджелудочной железы у пациента с фокальной формой ВГИ.

а — фокус гиперсекреции инсулина, метаплазия островков (окраска гематоксилином и эозином, $\times 20$); б — выраженная экспрессия инсулина в фокусе при проведении иммуногистохимии; в — ткань поджелудочной железы вне фокуса гиперсекреции инсулина (окраска гематоксилином и эозином, $\times 200$); г — низкая экспрессия инсулина вне фокуса при проведении иммуногистохимии.

Доступен на цветной вкладке и в сети Интернет:

<https://doi.org/10.14341/probl10317-4767>

Источник финансирования. Молекулярно-генетическое исследование и ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА выполнено при финансовой поддержке фонда поддержки и развития филантропии «КАФ».

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Участие авторов: М.А. Меликян, Д.Н. Губаева, И.Л. Никитина, Х. Кристесен — диагностика заболевания, ведение пациентов, подбор терапии; Д.В. Рыжкова, М.Д. Пойда — проведение ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА и оценка результатов; В.Г. Баиров, А.А. Сухочкая, Ю.Ю. Соколов, А.М. Ефременков — проведение оперативного лечения; Л.Б. Митрофанова — гистологическое исследование с определением формы врожденного гиперинсулинизма; Д.Н. Губаева, М.А. Меликян, Д.В. Рыжкова, И.Л. Никитина — сбор и анализ полученных данных, написание статьи; М.А. Меликян, Д.В. Рыжкова, И.Л. Никитина, Х. Кристесен — редактирование. Все авторы внесли значимый вклад в проведение исследования и подготовку статьи, прочли и одобрили финальную версию статьи перед публикацией.

ЛИТЕРАТУРА | REFERENCES

1. Banerjee I, Salomon-Estebanez M, Shah P, et al. Therapies and outcomes of congenital hyperinsulinism-induced hypoglycaemia. *Diabet Med J Br Diabet Assoc.* 2019;36(1):9-21. doi: <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/dme.13823>
2. Dunne MJ, Kane C, Shepherd RM, et al. Familial persistent hyperinsulinemic hypoglycemia of infancy and mutations in the sulfonylurea receptor. *N Engl J Med.* 1997;336(10):703-706. doi: <https://doi.org/10.1056/NEJM199703063361005>

3. Galcheva S, Demirbilek H, Al-Khawaga S, Hussain K. The genetic and molecular mechanisms of congenital hyperinsulinism. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2019;10:111. doi: <https://doi.org/10.3389/fendo.2019.00111>
4. Kapoor RR, Flanagan SE, Arya VB, et al. Clinical and molecular characterisation of 300 patients with congenital hyperinsulinism. *Eur J Endocrinol*. 2013;168(4):557–564. doi: <https://doi.org/10.1530/EJE-12-0673>
5. Yorifuji T. Congenital hyperinsulinism: current status and future perspectives. *Ann Pediatr Endocrinol Metab*. 2014;19(2):57–68. doi: <https://doi.org/10.6065/apem.2014.19.2.57>
6. Arya VB, Guemes M, Nessa A, et al. Clinical and histological heterogeneity of congenital hyperinsulinism due to paternally inherited heterozygous ABCC8/KCNJ11 mutations. *Eur J Endocrinol*. 2014;171(6):685–695. doi: <https://doi.org/10.1530/EJE-14-0353>
7. Blomberg BA, Moghbel MC, Saboury B, et al. The value of radiologic interventions and (18)F-DOPA PET in diagnosing and localizing focal congenital hyperinsulinism: systematic review and meta-analysis. *Mol Imaging Biol MIB Off Publ Acad Mol Imaging*. 2013;15(1):97–105. doi: <https://doi.org/10.1007/s11307-012-0572-0>
8. Giurgea I, Sempoux C, Bellanné-Chantelot C, et al. The Knudson's two-hit model and timing of somatic mutation may account for the phenotypic diversity of focal congenital hyperinsulinism. *J Clin Endocrinol Metab*. 2006;91(10):4118–4123. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2006-0397>
9. Mohnike K, Wieland I, Barthlen W, et al. Clinical and genetic evaluation of patients with katp channel mutations from the german registry for congenital hyperinsulinism. *Horm Res Paediatr*. 2014;81(3):156–168. doi: <https://doi.org/10.1159/000356905>
10. Меликян М.А., Карева М.А., Петрайкина Е.Е., и др. Врожденный гиперинсулинизм. Результаты молекулярно-генетических исследований в российской популяции // *Проблемы эндокринологии*. – 2012. – Т. 58. – № 2. – С. 3–9. [Melikyan MA, Kareva MA, Petraykina EE, et al. Congenital hyperinsulinism. Results of molecular-genetic investigations in a Russian population. *Problemy endocrinologii*. 2012;58(2):3–9. (In Russ).] doi: <https://doi.org/10.14341/probl20125823-9>
11. Ludwig A, Ziegenhorn K, Empting S, et al. Glucose metabolism and neurological outcome in congenital hyperinsulinism. *Semin Pediatr Surg*. 2011;20(1):45–49. doi: <https://doi.org/10.1053/j.sempedsurg.2010.10.005>
12. Helleskov A, Melikyan M, Globa E, et al. Both low blood glucose and insufficient treatment confer risk of neurodevelopmental impairment in congenital hyperinsulinism: a multinational cohort study. *Front Endocrinol (Lausanne)*. 2017;8:156. doi: <https://doi.org/10.3389/fendo.2017.00156>
13. Meissner T, Wendel U, Burgard P, et al. Long-term follow-up of 114 patients with congenital hyperinsulinism. *Eur J Endocrinol*. 2003;149(1):43–51. doi: <https://doi.org/10.1530/eje.0.1490043>
14. Shchederkina IO, Melikyan MA, Zavadenko AN, et al. Neurological paroxysmal disorders in children with hypoglycemia in congenital hyperinsulinism: polymorphism of clinical implications. *Epilepsy Paroxysmal Conditions*. 2015;7(2):49–58. doi: <https://doi.org/10.17749/2077-8333.2015.7.2.049-058>
15. Maiorana A, Barbetti F, Boiani A, et al. Focal congenital hyperinsulinism managed by medical treatment: a diagnostic algorithm based on molecular genetic screening. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2014;81(5):679–688. doi: <https://doi.org/10.1111/cen.12400>
16. Ismail D, Kapoor RR, Smith VV, et al. The heterogeneity of focal forms of congenital hyperinsulinism. *J Clin Endocrinol Metab*. 2012;97(1):E94–E99. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2011-1628>
17. Dastamani A, Yau D, Gilbert C, et al. Clinical outcomes of focal congenital hyperinsulinism – a UK perspective. *Endocr Abstr*. 2018. doi: <https://doi.org/10.1530/endoabs.58.oc4.7>
18. Koopmans KP, Neels ON, Kema IP, et al. Molecular imaging in neuroendocrine tumors: Molecular uptake mechanisms and clinical results. *Crit Rev Oncol Hematol*. 2009;71(3):199–213. doi: <https://doi.org/10.1016/j.critrevonc.2009.02.009>
19. De Lonlay P, Simon-Carre A, Ribeiro MJ, et al. Congenital hyperinsulinism: pancreatic [18F]fluoro-L-dihydroxyphenylalanine (DOPA) positron emission tomography and immunohistochemistry study of DOPA decarboxylase and insulin secretion. *J Clin Endocrinol Metab*. 2006;91(3):933–940. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2005-1713>
20. Meintjes M, Endozo R, Dickson J, et al. 18F-DOPA PET and enhanced CT imaging for congenital hyperinsulinism: initial UK experience from a technologist's perspective. *Nucl Med Commun*. 2013;34(6):601–608. doi: <https://doi.org/10.1097/MNM.0b013e32836069d0>
21. Barthlen W, Blankenstein O, Mau H, et al. Evaluation of [18F]Fluoro-L-DOPA positron emission tomography-computed tomography for surgery in focal congenital hyperinsulinism. *J Clin Endocrinol Metab*. 2008;93(3):869–875. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2007-2036>
22. Yang J, Yuan L, Meeks JK, et al. 18F-DOPA positron emission tomography/computed tomography application in congenital hyperinsulinism. *J Pediatr Endocrinol Metab*. 2012;25(7–8):619–622. doi: <https://doi.org/10.1515/jpem-2012-0114>
23. Adzick NS, Leon DD, States LJ, et al. Surgical treatment of congenital hyperinsulinism: results from 500 pancreatectomies in neonates and children. *J Pediatr Surg*. 2019;54(1):27–32. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jpedsurg.2018.10.030>
24. Wang X, Misawa R, Zielinski MC, et al. Regional differences in islet distribution in the human pancreas – preferential beta-cell loss in the head region in patients with type 2 diabetes. *PLoS One*. 2013;8(6):e67454. doi: <https://doi.org/10.1371/journal.pone.0067454>

Рукопись получена: 28.05.2019

Одобрена к публикации: 08.12.2019

Опубликована online: 14.12.2019

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ

*Губаева Дилара Наилевна [Diliara N. Gubaeva, MD]; адрес: Россия, 117036, Москва, улица Дм. Ульянова, д. 11 [address: 11 Dm. Ulyanova street, 117036 Moscow, Russia]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3922-2869>; eLibrary SPIN: 3431-3323; e-mail: gubaevadn@gmail.ru
Меликян Мария Арменаковна, к.м.н. [Maria A. Melikyan, MD, PhD]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-1491-2460>; eLibrary SPIN: 4184-4383; e-mail: melikian.maria@gmail.com

Рыжкова Дарья Викторовна, д.м.н., проф. [Daria V. Ryzhkova, MD, PhD, Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-7086-9153>; eLibrary SPIN: 7567-6920; e-mail: d_ryzkova@mail.ru

Пойда Михаил Дмитриевич [Mikhail D. Poyda, MD]; <https://orcid.org/0000-0002-0351-9874>; e-mail: mikhaelpoyda@gmail.com

Баиров Владимир Гиреевич, проф. [Vladimir G. Bairov, PhD, Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8734-2227>; eLibrary SPIN: 6025-8991; e-mail: vbairov@gmail.com

Сухоцкая Анна Андреевна, к.м.н. [Anna A. Sukhotskaya, MD, PhD]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-8446-830X>; eLibrary SPIN: 6863-7436; e-mail: anna.a.sukhotskaya@gmail.com

Соколов Юрий Юрьевич, проф. [Yurij Yu. Sokolov, PhD, Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3831-768X>; eLibrary SPIN: 9674-1049; e-mail: sokolov-surg@yandex.ru

Ефременков Артем Михайлович, к.м.н. [Artem M. Efremenko, MD, PhD]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-5394-0165>; eLibrary SPIN: 6873-6732; e-mail: efremart@yandex.ru

Митрофанова Любовь Борисовна, д.м.н. [Lyubov B. Mitrofanova, MD, PhD]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0735-7822>; eLibrary SPIN: 9552-8248; e-mail: lubamitr@yandex.ru

Henrik Christesen, MD, PhD; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-5330-6853>; e-mail: Henrik.christesen@rsyd.dk

Никитина Ирина Леоровна, д.м.н., проф. [Irina L. Nikitina, MD, PhD, Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4013-0785>; eLibrary SPIN: 7707-4939; e-mail: nikitina0901@gmail.com

КАК ЦИТИРОВАТЬ:

Губаева Д.Н., Меликян М.А., Рыжкова Д.В., Пойда М.Д., Баиров В.Г., Сухоцкая А.А., Соколов Ю.Ю., Ефременков А.М., Митрофанова Л.Б., Кристесен Х., Никитина И.Л. Клинические, генетические и радионуклидные характеристики пациентов с фокальной формой врожденного гиперинсулинизма // *Проблемы эндокринологии*. — 2019. — Т. 65. — №5. — С. 319-329. doi: <https://doi.org/10.14341/probl10317>

TO CITE THIS ARTICLE:

Gubaeva DN, Melikyan MA, Ryzhkova DV, Poyda MD, Bairov VG, Sukhotskaya AA, Sokolov YuYu, Efremenko AM, Mitrofanova LB, Christesen H, Nikitina IL. Clinical, genetic and radionuclide characteristics of the focal form of congenital hyperinsulinism. *Problems of Endocrinology*. 2019;65(5): 319-329. doi: <https://doi.org/10.14341/probl10317>

Рис. 3. Результаты ПЭТ/КТ с ^{18}F -ДОФА у пациентов с различными морфологическими формами ВГИ.

а — диффузная форма ВГИ. Захват ^{18}F -ДОФА равномерен; б — фокальная форма ВГИ. Визуализируется очаг накопления радиофармпрепарата; в — эктопическая локализация фокальной формы ВГИ. Очаг накопления радиоизотопа визуализируется в области двенадцатиперстной кишки.

Рис. 4. Гистологическое исследование ткани поджелудочной железы у пациента с фокальной формой ВГИ.

а — фокус гиперсекреции инсулина, метаплазия островков (окраска гематоксилином и эозином, 1×20); б — выраженная экспрессия инсулина в фокусе при проведении иммуногистохимии; в — ткань поджелудочной железы вне фокуса гиперсекреции инсулина (окраска гематоксилином и эозином, 1×200); г — низкая экспрессия инсулина вне фокуса при проведении иммуногистохимии.