АССОЦИАЦИЯ СТРУКТУРЫ ГЛЮКОКОРТИКОИДНОГО РЕЦЕПТОРА И ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНА NR3C1 С МЕТАБОЛИЧЕСКИМИ НАРУШЕНИЯМИ

© С.С. Бровкина^{1*}, И.С. Джериева¹, Н.И. Волкова¹, Т.П. Шкурят², З.А. Гончарова¹, Е.В. Машкина², И.Б. Решетников¹

¹Ростовский государственный медицинский университет, Ростов-на-Дону, Россия

²Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону, Россия

Глюкокортикоидная терапия широко используется при лечении различных патологий. Чувствительность к глюкокортикоидам (ГК) оказывает серьезное влияние не только на эффективность их действия, но и на выраженность побочных эффектов, формирование факторов риска и развитие сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Вариабельность чувствительности к ГК обуславливает различные фенотипы и выраженность метаболических нарушений, лежащих в основе ССЗ. Среди них можно выделить снижение мышечной массы и силы, ожирение, нарушение углеводного, липидного обмена и другие. ГК осуществляют свои эффекты путем связывания с глюкокортикоидным рецептором (ГР), в связи с чем это считается критической точкой в их действии. В настоящем обзоре представлены данные о значении структуры ГР, рассмотрены основные полиморфные варианты гена ГР NR3C1, ассоциированные с гиперчувствительностью или относительной резистентностью к ГК в контексте метаболических нарушений и развития ССЗ. Подробно описаны ассоциации 4 наиболее изученных полиморфных локусов гена ГР NR3C1 с метаболическими рисками: BclI (rs41423247), N363S (rs56149945), ER22/23EK (rs6189/rs6190), GR-9β (rs6198). Их определение может способствовать уточнению прогноза как эффективности ГК, так и развития метаболических нарушений, и последующей ранней коррекции факторов риска ССЗ.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: глюкокортикоидный рецептор; полиморфные варианты гена NR3C1; метаболические нарушения; сердечно-сосудистые заболевания.

ASSOCIATION OF THE STRUCTURE OF THE GLUCOCORTICOID RECEPTOR AND SINGLE NUCLEOTIDE NR3C1 GENE POLYMORPHISMS WITH METABOLIC DISORDERS

© Snezhana S. Brovkina^{1*}, Irina S. Dzherieva¹, Natalya I. Volkova¹, Tatiana P. Shkurat², Zoya A. Goncharova¹, Elena V. Mashkina², Igor B. Reshetnikov¹

¹Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russia

²Southern Federal University, Rostov-on-Don, Russia

Glucocorticoid therapy is widely used in the treatment of various pathologies. Sensitivity to glucocorticoids (GC) has a serious impact not only on the effectiveness of their action, but also on the severity of side effects, the formation of risk factors and the development of cardiovascular diseases (CVD). Variability of sensitivity to GC causes different phenotypes and severity of metabolic disorders underlying CVD. Among them, one can distinguish a decrease in muscle mass and strength, obesity, glucose and lipid metabolism impairment, and others. Glucocorticoids carry out their effects by binding to the glucocorticoid receptor (GR), and therefore this is considered a critical point in their action. This review presents data on the significance of the glucocorticoid receptor structure, examines the main single nucleotide polymorphisms (SNP) of the NR3C1 gene associated with hypersensitivity or relative resistance to glucocorticoids in the context of metabolic disorders and the development of CVD. The association of the four most studied SNP of the GR gene with metabolic risks is described in detail: BclI (rs41423247), N363S (rs56149945), ER22/23EK (rs6189/rs6190), GR-9β (rs6198). Their determination can contribute to clarifying the prognosis of both the effectiveness of GC and the development of metabolic disorders, and subsequent early correction of CVD risk factors.

KEYWORDS: glucocorticoid receptor; SNP; metabolic disorders; cardiovascular diseases.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) вызывают более трети всех смертей в мире по данным ВОЗ [1]. В настоящее время существует возможность снизить частоту их развития при воздействии на факторы риска: гиподинамию, курение, употребление большого количества соли, злоупотребление алкоголем, нездоровое питание, высокое артериальное давление (АД), нарушение углеводного, липидного обмена, избыточную массу

тела и ожирение [2]. Ответственность за приверженность здоровому образу жизни и воздействие на поведенческие факторы риска в основном возлагается на самого пациента. Однако на современном этапе особое значение приобретают как ятрогенный фактор риска, зависящий от пациента и врача, так и генетическая предрасположенность, на которую пока мы воздействовать не можем.

Применение глюкокортикоидов (ГК) серьезно влияет на метаболические процессы и приводит к побочным эффектам, которые являются факторами риска ССЗ [3–5]. Международное медицинское сообщество было особенно озабочено необходимостью и целесообразностью применения ГК в свете пандемии вируса SARS-CoV-2 [6]. Отмечено, что даже однократное введение ГК может вызывать негативные последствия, в том числе острую стероидную миопатию [7]. Это осложнение получало немного внимания, но в настоящее время ему придается все большее значение. Проведены исследования, рассматривающие состояние мышечной ткани как самостоятельный фактор риска и предиктор негативного исхода различных заболеваний, в том числе хронической сердечной недостаточности, хронической болезни почек и других патологий [8, 9].

Следовательно, последствия применения ГК, в том числе стероидная миопатия, увеличивают риск развития ССЗ, ухудшают качество жизни, а также могут привести к фатальным исходам. Побочные эффекты ГК также наносят существенный экономический урон. Итальянские исследователи проанализировали с помощью динамической имитационной модели с использованием данных Итальянской национальной системы здравоохранения (INHS) стоимость лечения побочных эффектов оральных ГК. Учитывалось возникновение диабета 2 типа, ожирения, дислипидемии, бессонницы и других состояний. При этом стоимость лечения в течение года для одного пациента начиналась от 1065€, а при применении оральных ГК на фоне бронхиальной астмы средней и тяжелой степеней тяжести она возрастала на 892€ и 606€ соответственно [10].

При этом благодаря своей эффективности, разнообразию форм и удобству применения ГК входят в число одних из самых часто назначаемых препаратов. Так, во Франции распространенность перорального применения ГК колебалась от 14,7 до 17,1% населения [11]. Однако частота назначения и применения ГК в России до настоящего времени остается неотслеженной [12].

Среди факторов риска ССЗ есть те, на которые мы не можем повлиять, — например, генетическая предрасположенность и наследственный анамнез. В свете распространенности применения ГК приобретает особенное значение гиперчувствительность как к эндогенным, так и к экзогенным ГК, обусловленная полиморфными вариантами гена глюкокортикоидного рецептора (ГР). Это приводит к более выраженным проявлениям нежелательных побочных эффектов и метаболическим нарушениям. Существуют и полиморфные локусы, ассоциированные с устойчивостью к ГК, что проявляется неспособностью ГК оказывать желаемое воздействие на ткани-мишени, ограничивая эффективность лечения. Варибельность гена ГР может сказываться, в том числе, на функционировании сердечно-сосудистой системы [13, 14].

Сочетание поведенческих факторов риска с генетическими изменениями на фоне терапии ГК повышает риски ССЗ. В связи с чем для повышения безопасности и эффективности лечения с применением ГК, разработки новых подходов к ведению пациентов, получающих данные препараты, необходимо иметь всестороннее представление о факторах, влияющих на метаболизм и эффекты ГК. Поскольку связывание с ГР является кри-

тическим процессом в действии ГК, этот обзор направлен на то, чтобы представить обновленную информацию о значении варибельности структуры гена ГР и ее влиянии на сердечно-сосудистую систему и метаболические процессы, обуславливающие риск ССЗ.

При поиске источников были использованы полнотекстовые и реферативно-библиографические базы данных: Embase, Google Scholar, Ensembl.org, Cyberleninka.ru, Library Wiley.com, Web of Science, PubMed, Elsevier (ScienceDirect). Анализ литературы проведен за 30 лет (с 1991 по 2021 гг.). Поиск источников осуществлялся по следующим ключевым словам с соответствующим переводом для англоязычных баз с использованием логических операторов AND, OR: полиморфизмы гена глюкокортикоидного рецептора *NR3C1*, ожирение, метаболический синдром, дислипидемия, артериальная гипертензия, миопатия, мышечная сила, масса, гипергликемия, инсулинорезистентность, сердечно-сосудистые заболевания. В поиск были включены клинические и оригинальные исследования, систематические обзоры, метаанализы.

ГЛЮКОКОРТИКОИДНЫЙ РЕЦЕПТОР: ИЗОФОРМЫ

ГР экспрессируется во всех клетках организма с ядрами и кодируется геном ГР *NR3C1*, который расположен на пятой хромосоме (5q31–32) у человека. ГР действует как лиганд-индуцируемый фактор транскрипции и регулятор других факторов транскрипции, относится к суперсемейству ядерных рецепторов [15].

У человека ген ГР состоит из девяти экзонов. Рецептор имеет несколько изоформ, например, ГР α и ГР β , которые являются результатом альтернативного сплайсинга экзона 9 [16]. С транскрипта, то есть молекулы мРНК, ГР α может осуществляться инициация трансляции с нескольких старт-кодонов, расположенных в экзоне 2 гена *NR3C1*, генерируя восемь дополнительных изоформ ГР (ГР α -А, ГР α -В, ГР α -С1, ГР α -С2, ГР α -С3, ГР α -D1, ГР α -D2 и ГР α -D3) [16]. Они демонстрируют некоторые различия, например, изоформа ГР-С повышает восприимчивость к апоптозу в культуре клеток, а ГР-D приводит к относительной устойчивости к апоптозу в тех же условиях [17].

С клинической точки зрения важно понимать, что вариант ГР β не связывает ГК и действует как естественный доминантный ингибитор изоформы ГР α на многих генах-мишенях, чувствительных к ГК [18]. Способность ГР β ингибировать активность изоформы ГР α предполагает, что высокие уровни ГР β могут привести к резистентности к ГК [19]. Воспалительный процесс может увеличить экспрессию β -изоформы. Было показано, что провоспалительные цитокины особенно сильно активируют механизмы альтернативного сплайсинга [20]. Данный факт может частично объяснять случаи недостаточного ответа на ГК-терапию воспалительных заболеваний.

Однако действия изоформы ГР β не ограничены ее эффектами на ГР α . Выявлено, что ГР β , кроме ядра, находится в цитоплазме клетки, обладает внутренней активностью и регулирует множество генов, связанных с воспалительным процессом, клеточной коммуникацией, миграцией, каждый из которых независим от ГР α . Кроме того, ГР β был связан с увеличением миграции клеток и снижением чувствительности к ГК-индуцированному апоптозу [21, 22].

ГРβ контролирует рост клеток, метаболические процессы, такие как глюконеогенез и обмен липидов. Несколько сообщений показало, что в клеточных линиях человека и мыши (миобласты, эмбриональные фибробласты, клеточная линия макрофагов и др.) инсулин повышает уровень мРНК и белка ГРβ [23]. Это было подтверждено исследованиями *in vivo*, в которых отмечена повышенная экспрессия ГРβ в печени генетически диабетических крыс Гото-Какидзаки, характеризующихся значимо повышенным уровнем инсулина по сравнению с контрольной группой [24]. Таким образом, эти исследования показали, что гиперинсулинемия сопровождается повышением количества ГРβ, что может приводить к худшему ответу на ГК-терапию.

Количество ГРβ повышается у мышей в жировой ткани и печени при ожирении, вызванном диетой, насыщенной жирами. Участие ГРβ в функциях печени было дополнительно продемонстрировано у мышей путем сверхэкспрессии ГРβ в печени при стандартном количестве жиров в рационе [25]. В результате происходило накопление триглицеридов в печени и их увеличение в сыворотке крови, тем самым способствуя патогенезу неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Также отмечалось увеличение белка синтазы жирных кислот в печени, говорящее об активности образования жирных кислот *de novo*. Наблюдалось снижение накопления гликогена в печени и повышение гликемии натощак, вероятно, за счет печеночной инсулинорезистентности. Внимание привлекает также снижение активности сигнальных путей, опосредованных печеночными PPARα и фактором роста фибробластов 21, вызывающих при действии ГК липолиз во время голодания. Таким образом, большая экспрессия ГРβ в печени может обуславливать развитие НАЖБП, гипертриглицеридемии, снижение липолиза и адаптации к голоданию.

С учетом описанных механизмов, можно предположить, что ожирение, считающееся обычно следствием избыточного действия и гиперчувствительности к ГК, за счет гиперинсулинемии, увеличения экспрессии ГРβ может самостоятельно приводить к снижению терапев-

тического эффекта ГК и ухудшению липидного профиля, замыкая порочный круг.

Дополнительные изоформы ГР были связаны с нечувствительностью к ГК. ГРγ проявляет около 50% активности ГРа, ГР-Р и ГР-А имеют серьезные нарушения структуры и не связывают ГК, способствуя резистентности к последним. ГР-Р при этом модулирует транскрипционную активность ГРа специфичным для клеток образом [23–25].

Таким образом, различные ткани демонстрируют специфичную распространенность изоформ ГР, которая может меняться в ответ на уникальные стимулы, такие как гиперинсулинемия, ожирение, старение и другие. Эти различия имеют, по-видимому, решающее значение для определения тканеспецифического действия ГК. Однако даже изменения одного нуклеотида в последовательности ДНК гена *NR3C1* могут сказываться на эффектах ГК. Ассоциация однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП), возникающих в результате точечных мутаций в гене ГР, чувствительности к ГК и развития метаболических нарушений, будет подробно рассмотрена ниже.

ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНА ГЛЮКОКОРТИКОИДНОГО РЕЦЕПТОРА

Сообщалось о различных полиморфных локусах гена ГР, связанных с измененной чувствительностью к ГК. Они не были сконцентрированы в каких-то определенных областях гена. Кроме того, некоторые из них обнаруживаются в области гена, не кодирующей белок [26]. Ассоциированными с ССЗ или с лежащими в их основе факторами риска считаются варианты *ER22/23EK (rs6189/rs6190)*, *ГР-9β (rs6198)*, *N363S (rs56149945)* и *BclII (rs41423247)*. Было показано, что гиперчувствительность к ГК возникла при наличии *N363S (rs56149945)* и *BclII (rs41423247)*. Полиморфные варианты гена *ER22/23EK (rs6189/rs6190)*, *ГР-9β (rs6198)* были ассоциированы с резистентностью к ГК в контексте более здорового метаболического профиля [27]. Обобщенные данные приведены в таблице 1.

Таблица 1. Ассоциация полиморфизмов гена *NR3C1* с метаболическими изменениями

Полиморфизм гена <i>NR3C1</i>	Чувствительность к ГК	Ассоциация	Ссылки
<i>BclII (rs41423247)</i>	Повышенная	Ожирение, дислипидемия, гиперинсулинемия, большая жировая масса, гипергликемия	J. Weaver et al. [29], R. Rosmond et al. [30], R. Giordano et al. [31], A. Tremblay et al. [32], C. Geelen et al. [33], P. Barat et al. [34], C. Kaymak et al. [35], A. Zawiejska et al. [36]
<i>N363S (rs56149945)</i>	Повышенная	Ожирение, гиперинсулинемия, большее отношение ОТ к ОБ, большой ИМТ, метаболический синдром	N. Huizenga et al. [38], A. Di Blasio et al. [39], M. Dobson et al. [41], A. Marti et al. [42], M. Savas et al. [43], E. Wester et al. [44]
<i>ER22/23EK (rs6189/rs6190)</i>	Сниженная	Меньшие концентрации инсулина, ЛПНП, С-реактивного белка, гликемия, прибавка в весе во время беременности; большие безжировая масса тела, мышечная сила, продолжительность жизни	E. van Rossum et al. [46], E. van Rossum et al. [47], E. van Rossum et al. [48], M. Finken et al. [50], R. Bertalan et al. [51]
<i>ГР-9β (rs6198)</i>	Сниженная	Сниженный риск ожирения, тревожность, потребление сахара, большие ЛПВП, мышечная сила	M. Savas et al. [43], B. Liu et al. [53], L. Müller et al. [54], D. Rodrigues et al. [57]

ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНА *NR3C1*, АССОЦИИРОВАННЫЕ С ГИПЕРЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬЮ К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ

Полиморфный вариант гена *NR3C1* ГР *BclI* (*rs41423247*) является результатом замены нуклеотидов во 2 интроне (цитозин-гуаниновая трансверсия). Согласно базе данных Ensembl, в европейской популяции идентифицируется со следующими частотами: аллель G — 62%, минорный аллель C — 38%; генотипы GG, GC, CC — 37,4, 49,3, 13,3% соответственно [28]. Наличие мутантного аллеля *BclI* (*rs41423247*) ГР ассоциировано с относительной гиперчувствительностью к ГК.

В одной из ранних работ J. Weaver и соавт. [29] показали ассоциацию между наличием *BclI* (*rs41423247*) и гомеостазом глюкозы. В исследование были включены 56 женщин с ожирением (средний индекс массы тела (ИМТ) 42 (34–59) кг/м²) и 43 здоровые женщины. Среди гомозигот по мутантному аллелю с ожирением наблюдались значительное повышение концентрации инсулина натощак и повышенный индекс инсулинорезистентности (НОМА) по сравнению с группой, гомозиготной по нормальному аллелю, и гетерозиготами. Авторами была выдвинута одна из первых гипотез о том, что наличие изменений в гене *NR3C1* ГР может непосредственно влиять на экспрессию генов ГК-рецепторов или быть связано с модуляцией транскрипционной активности генов, кодирующих белки, ответственные за поддержание гомеостаза глюкозы.

Другие исследования, проведенные с 2000 г., выявили связь между описанным вариантом и метаболическими нарушениями, встречающимися при применении ГК [30, 31]. На основании полученных данных можно утверждать, что не только гомозиготы по мутантному аллелю, но и гетерозиготы имели метаболические изменения, эффект являлся аллель-зависимым. В ходе 12-летнего наблюдения в исследовании, проведенном A. Tremblay и соавт. [32], продемонстрировано, что гетерозиготы по полиморфизму *BclI* (*rs41423247*) имеют повышенную склонность к накоплению жировой ткани по сравнению с гомозиготами по обоим аллелям. Данные двух голландских когортных исследований (Hoorn и CODAM) C. Geelen и соавт. [33] показали, что гомозиготы по мутантному аллелю имеют значительно больший процент жировой массы тела, ИМТ и более выраженную инсулинорезистентность. К аналогичному выводу привели результаты обследования детей, страдающих ожирением. Двухэнергетическая рентгеновская абсорбциометрия, позволяющая проводить более точные исследования, чем антропометрия, показала, что гомозиготы по мутантному аллелю имели повышенную жировую массу тела [34]. Среди педиатрических пациентов с острым лимфобластным лейкозом также выявлено, что у носителей полиморфного локуса *BclI* (*rs41423247*) с большей вероятностью разовьются признаки синдрома гиперкортицизма (например, ожирение, гипертония, диабет) и депрессия во время системной терапии ГК [35]. Приведенные факты могут подтвердить гипотезу о том, что полиморфный вариант *BclI* (*rs41423247*) ассоциирован с негативными метаболическими последствиями.

В недавнем исследовании показано, что беременные женщины, гомозиготы по полиморфному варианту *BclI*

(*rs41423247*), имели больший риск развития гипергликемии [36]. Возможным объяснением данного факта может стать то, что сама беременность является состоянием, характеризующимся инсулинорезистентностью как механизмом адаптации. Наличие полиморфного варианта *BclI* (*rs41423247*), вероятно, приводило к чрезмерному усилению изменений, что ассоциировалось с гипергликемией. Клиническое значение определения данного ОНП гена ГР может состоять в выявлении подгрупп пациентов из группы риска метаболических нарушений, которые в наибольшей степени выиграют от разработки персонализированного подхода с более частым лабораторным контролем, рекомендациями по физической нагрузке.

С проявлениями относительной гиперчувствительности к ГК также связывают один из наиболее часто описываемых полиморфных вариантов гена ГР *NR3C1* — *N363S* (*rs56149945*). Он приводит к транзитивной мутации во 2 экзоне гена *NR3C1* 1220 нуклеотида (замена аденина на гуанин) и как следствие — к замене в кодоне 363 аспарагина на серин в полипептидной цепи рецептора ГР. Частота аллельных вариантов по локусу *N363S* (*rs56149945*) в европейской популяции оценивается как аллель T 98,2%, аллель C 1,8%; генотипы TT — 96,4%, CT — 3,6% [37].

Ассоциация между полиморфным вариантом *N363S* (*rs56149945*) гена *NR3C1* и избыточной массой тела была показана еще N. Huizenga и соавт. [38]. Гетерозиготные носители имели более высокий ИМТ. Авторы показали, что полиморфный вариант *N363S* (*rs56149945*) ассоциирован с повышенной чувствительностью ГР *in vivo*. Уровни глюкозы натощак перед введением дексаметазона были одинаковыми в группе гетерозигот *N363S* (*rs56149945*) и в группе, не имеющей данной мутации, но после введения 1 мг дексаметазона уровень инсулина в плазме значительно увеличился среди пациентов гетерозигот. Предполагалось, что низкие дозы стероидов вызывают рост секреции инсулина для поддержания нормального уровня гликемии. Это дополнительно указывает на то, что носители полиморфного варианта *N363S* (*rs56149945*) более чувствительны к ГК.

Еще одно исследование, проведенное командой A. Di Blasio's [39], подтвердило ассоциацию между ожирением и полиморфным локусом *N363S* (*rs56149945*). Были обследованы пациенты с ожирением (средний ИМТ 45,9±0,9 кг/м²) и пациенты с нормальной массой тела. Гетерозиготный вариант *N363S* (*rs56149945*) встречался чаще среди пациентов с ожирением. Гетерозиготные по данной мутации женщины с ожирением имели значительно больший ИМТ, чем гомозиготы по нормальному аллелю. Среди мужчин значимых различий выявлено не было. Обладатели обоих полиморфных вариантов *BclI* (*rs41423247*) и *N363S* (*rs56149945*) имели большие АД систолическое и диастолическое, а также хуже липидный профиль. На основе своих наблюдений A. Di Blasio и соавт. пытались объяснить патофизиологическую роль *N363S* (*rs56149945*) в развитии ожирения, предполагая, что повышенная чувствительность носителей этого генетического варианта к ГК может приводить к повышенной секреции инсулина в ответ на гормональный стимул, которая теоретически может лежать в основе усиленного липогенеза и возможного последующего увеличения массы тела.

Связь между полиморфным вариантом *N363S* (*rs56149945*) и увеличенной массой тела была поставлена под сомнение R. Rosmond и соавт. [40] и M. Dobson и соавт. [41]. Ученые не выявили взаимосвязи между наличием мутантного аллеля и увеличением массы тела. Однако M. Dobson и соавт. подтвердили более высокие значения отношения окружности талии (ОТ) к окружности бедер (ОБ) среди мужчин гетерозигот.

В 2006 г. A. Marti и соавт. [42] опубликовали метаанализ влияния полиморфного локуса *N363S* (*rs56149945*) на ожирение. В него были включены исследования, проведенные среди населения Испании и Германии, принята попытка обобщить данные из ранее опубликованных 12 исследований. Общее количество испытуемых составило 5909 человек из разных стран мира. В связи с большой гетерогенностью популяции по массе тела выделено 4 исследования, куда вошли пациенты с ИМТ менее 27 кг/м². Анализ этой подгруппы показал, что носители мутантного аллеля в выделенной подгруппе имели статистически значимо больший ИМТ при сравнении с гомозиготами по нормальному аллелю. Однако достоверных данных, подтверждающих ассоциацию *N363S* (*rs56149945*) с риском ожирения и величиной ИМТ, в итоге получено тоже не было.

Тем не менее в последние годы проведены крупные популяционные исследования, подтверждающие взаимосвязь полиморфных вариантов гена *GP* с метаболическими изменениями. В работу группы голландских врачей M. Savas и соавт. [43] включены более 10 тысяч человек. Большая часть пациентов получали ГК топически (ингаляционно, интраназально, на кожу), однако были включены и пациенты с системной ГК-терапией. Вероятность развития метаболического синдрома была выше в группе ГК с неизменным генотипом *GP* в 1,64 раза (95% доверительный интервал (ДИ) 1,06–2,55; $p=0,027$) и 1,43 раза (95% ДИ 1,08–1,91; $p=0,013$) в группе с гиперчувствительными вариантами гена *GP* (*Bcl1* (*rs41423247*), *N363S* (*rs56149945*)) по сравнению с пациентами, не получающими ГК. При этом значимой разницы у пациентов с системной ГК-терапией не было выявлено. Такую находку, вероятно, можно объяснить ограниченной выборкой пациентов с системной терапией. ОТ, в свою очередь, была увеличена во всех группах, получающих ГК, вне зависимости от наличия измененных вариантов гена *GP*. Была отмечена тенденция к увеличению ОТ в группе с гиперчувствительными генотипами *GP* (резистентный генотип *GP* (*ER22/23EK* (*rs6189/rs6190*), *A3669G* (*rs6198*)) +2,34 см [95% ДИ 0,10–4,59], $p=0,040$; гомозиготы по нормальному аллелю +3,80 см [95% ДИ 1,62–5,97], $p<0,001$; гиперчувствительный генотип *GP* (*Bcl1* (*rs41423247*), *N363S* (*rs56149945*)) +4,72 см [95% ДИ 3,34–6,11], $p<0,001$)).

V. Wester и соавт. [44] в популяционном исследовании с участием более 12 тысяч человек также показали, что *N363S* (*rs56149945*) ассоциирован с увеличением частоты метаболического синдрома, но только у более молодых мужчин (средний возраст 47 лет или ниже; ОШ 1,77; $p=0,005$) и у людей с низким уровнем образования (ОШ 1,48; $P=0,039$). Таким образом, выявлены данные, свидетельствующие о связи полиморфных локусов гена *GP* *NR3C1* с относительной гиперчувствительностью к ГК и метаболическими нарушениями, но существуют

и факты, противоречащие этому. В связи с чем большее количество исследований поможет оценить фенотипы данных полиморфизмов и уточнить их роль в формировании кардиометаболических рисков.

ПОЛИМОРФНЫЕ ВАРИАНТЫ ГЕНА *NR3C1*, АССОЦИИРОВАННЫЕ С РЕЗИСТЕНТНОСТЬЮ К ГЛЮКОКОРТИКОИДАМ

Полиморфный вариант гена *GP* *ER22/23EK* (*rs6189/rs6190*) ассоциирован с относительной резистентностью к ГК. Данные изменения вызваны двумя связанными точечными мутациями в соседних нуклеотидах. Первая нуклеотидная замена в 198 положении является синонимичной и не изменяет кодируемую 22 кодоном аминокислоту (глутаминовая кислота). Другая мутация приводит к замене аргинина на лизин в 23 кодоне полипептидной цепи рецептора. В европейской популяции частота аллелей составляет: С — 97%, Т — 3%, а генотипов: СС — 94%, СТ — 6 [45].

Исследования *in vivo* показали, что носители полиморфизма *ER22/23EK* (*rs6189/rs6190*), в отличие от широко описанного *N363S* (*rs56149945*), имеют благоприятный метаболический профиль, вероятно, из-за их сниженной чувствительности к влиянию ГК. В исследовании E. van Rossum и соавт. [46], проведенном с участием 202 пожилых людей, было идентифицировано 18 гетерозигот (8,9%). Дважды проводился супрессивный тест с дексаметазоном, дозы составляли 0,25 мг и 1 мг. Цель исследования состояла в том, чтобы сравнить концентрации кортизола и инсулина в плазме у носителей описанного полиморфного варианта и людей без мутантного аллеля. После введения 1 мг дексаметазона в группе носителей *ER22/23EK* (*rs6189/rs6190*) наблюдались повышенные уровни кортизола в плазме. Более того, у носителей данного полиморфизма были ниже концентрации инсулина и липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) во время голодания. Наличие мутации было ассоциировано со снижением концентрации инсулина и глюкозы крови до и после супрессивного теста с 1 мг дексаметазона. Таким образом, предположено, что носители мутантного аллеля *ER22/23EK* (*rs6189/rs6190*) более устойчивы к влиянию ГК и чувствительны к инсулину, что отражается в виде более благоприятного метаболического профиля.

E. Van Rossum и соавт. [47] также предприняли попытку проанализировать действие ГК на перераспределение жировой ткани, а также мышечную силу с учетом наличия *ER22/23EK* (*rs6189/rs6190*) среди молодых людей в возрасте 13–36 лет. Этот эффект гормонов коры надпочечников играет важную роль в липидном обмене и напрямую связан с чувствительностью к инсулину, развитием потенциальных нарушений гомеостаза глюкозы и, как следствие, сильно влияет на общий сердечно-сосудистый риск. Авторы в течение 23 лет наблюдали за участниками исследования, чтобы сравнить антропометрические параметры носителей описанного полиморфного варианта гена *GP* с людьми без мутантного аллеля. Процент носителей *ER22/23EK* (*rs6189/rs6190*) был аналогичен таковому из предыдущего исследования и достигал 8%. Было показано, что носители были выше ростом, имели большую безжировую массу тела, большую ОБ и большую мышечную силу. Среди женщин наблюдался более

низкий показатель отношения ОТ к ОБ. Разницы в ИМТ или жировой массе при этом замечено в обеих группах не было.

Наблюдения датских ученых показывают, что полиморфный вариант *ER23/22EK (rs6189/rs6190)* может быть ассоциирован с продолжительностью жизни [48]. Исследование, включившее группу мужчин в возрасте $77,8 \pm 3,6$ года, показало, что среди лиц без полиморфного варианта *ER23/22EK (rs6189/rs6190)* за 4-летний период наблюдения процент смертей составил 19,2%, в то время как в группе носителей мутации период наблюдения пережили все. У пациентов с полиморфным вариантом *ER23/22EK (rs6189/rs6190)* наблюдались более низкие уровни С-реактивного белка, общего холестерина и ЛПНП, что обуславливало лучший сердечно-сосудистый профиль. Важно подчеркнуть у них более высокий процент безжировой массы тела, который связан с большей чувствительностью к инсулину и является важным фактором снижения общего сердечно-сосудистого риска. Описанные отличия в совокупности, вероятно, могли повлиять на большую продолжительность жизни.

В 2006 г. М. Kuningas и соавт. [49] опубликовали несколько противоречивые данные — результаты исследования влияния полиморфных вариантов гена *GP* на общий сердечно-сосудистый риск в группе людей старше 85 лет. Носители мутаций *ER23/22EK (rs6189/rs6190)* имели более высокие уровни HbA1c. Кроме того, у этих пациентов был выявлен повышенный уровень С-реактивного белка. Тем не менее ассоциации с сердечно-сосудистым риском или смертностью ни в одной из групп не было обнаружено.

Иные данные были получены среди детской популяции. Голландские авторы [50] на основе 19-летнего наблюдения за группой недоношенных детей, рожденных до 32-й недели, показали, что наличие полиморфного аллеля связано с более низкой концентрацией инсулина натощак и более низкими значениями индикаторов инсулинорезистентности. Также было выявлено, что у носителей мутаций *ER23/22EK (rs6189/rs6190)* наблюдался дефицит роста в возрасте до одного года, однако их конечный рост был аналогичен среднему росту населения. В это время в группе недоношенных детей без *ER23/22EK (rs6189/rs6190)* конечный рост был в среднем на половину стандартного отклонения меньше. Как равенство роста, так и более низкие уровни инсулина, по-видимому, подтверждают гипотезу об относительной резистентности носителей *ER23/22EK (rs6189/rs6190)* к эффектам ГК и большей чувствительности к инсулину.

Защитная роль полиморфного локуса *ER22/23EK (rs6189/rs6190)* также наблюдалась группой венгерских ученых R. Bertalan и соавт. [51]. Среди женщин, гетерозиготных носителей данного полиморфного варианта, отмечена меньшая прибавка в весе во время неосложненной беременности. Тем не менее остается открытым вопрос о влиянии пола на фенотипические проявления различных вариантов гена *GP*. Зачастую это связано с недостаточным объемом выборки и отсутствием разделения носителей ОНП по полу. Для оценки вклада половой принадлежности необходимо больше исследований с более строгим дизайном.

Полиморфный вариант гена *NR3C1 GP 9β (A3669G или rs6198)* также ассоциирован с относительной резистент-

ностью к ГК. Он связан с заменой А на G в 3'-UTR конце экзона 9. Для европейской популяции наблюдается следующая частота аллелей: Т — 82,6%, С — 17,4%. Генотипическая структура представляет собой соотношение: ТТ — 69,2%, СТ — 26,8%, СС — 4% [52].

Наличие полиморфного аллеля также ассоциировано с более благоприятным метаболическим профилем и связано со снижением риска ожирения у женщин, снижением уровня общего холестерина и повышением уровня холестерина ЛПВП [53]. В ранее упомянутом исследовании М. Savas et al. [43] отмечают отсутствие или минимально выраженные побочные эффекты применения ГК в группе носителей резистентных полиморфных вариантов, в том числе *A3669G (rs6198)*.

Известно, что мышечная ткань участвует в утилизации глюкозы и играет роль в развитии метаболических нарушений. ГК могут негативно влиять на мышцы, вызывая стероидную миопатию. Коллективом немецких ученых в недавнем исследовании у пациентов с эндогенным синдромом гиперкортицизма была оценена связь полиморфных вариантов гена *GP* с состоянием мышечной ткани [54]. Среди пациентов с активным заболеванием носители полиморфного аллеля *A3669G (rs6198)* имели большую мышечную силу по сравнению с гомозиготами по нормальному аллелю ($p=0,006$ для доминантной и $p=0,021$ для недоминантной руки соответственно). В связи с чем можно предположить, что обладатели неизмененного генотипа *AA3669* более восприимчивы к избытку ГК, чем носители мутантного аллеля, которые защищены относительной резистентностью к ГК от развития миопатии. Среди мужчин — гомозигот по референсному аллелю *ER22/23EK (rs6189/rs6190)* была отмечена меньшая мышечная сила относительно пациентов с полиморфным аллелем ($p=0,049$ для доминантной руки; $p=0,027$ для недоминантной руки). Полученные данные могут дать объяснение различиям между пациентами при развитии ГК-индуцированной миопатии. Что получает особое значение, учитывая факт корреляции низкой мышечной силы с более высокой смертностью и низким качеством жизни [55].

Мышечная масса, дислипидемия, атеросклероз и другие метаболические процессы в совокупности влияют на гемодинамику. Наличие полиморфного варианта *A3669G (rs6198)* и изменение артериального давления были отмечены в недавнем исследовании у пациентов с синдромом или болезнью Кушинга, находящихся в длительной ремиссии [56]. Так, у носителей данного варианта гена *GP* отмечали более высокий уровень систолического АД и более низкие уровни резистина. Однако полученные данные следует интерпретировать с осторожностью в связи с небольшой выборкой и фактом того, что после лечения часть пациентов получали препараты ГК по поводу развившегося гипокортицизма.

Одним из аспектов, играющих роль в метаболических нарушениях, также являются пищевые привычки и ментальный статус. Было показано, что у пациентов, имеющих аллель *3669G (rs6198)*, отмечены более низкие уровни употребления сахара и общей энергетической ценности пищи, а также более высокая чувствительность к инсулину и меньшая тревожность [57]. Эти данные получены среди детей и подростков от 10 до 17 лет, которые находились под наблюдением в течение 5 лет.

Полученные результаты подчеркивают, что эта генетическая вариация в гене ГР связана со снижением чувствительности к ГК, что на когнитивном и поведенческом уровнях приводит к изменению характера потребления пищи и реакций на эмоциональный стресс. Этот генетический вариант может сыграть важную роль в снижении риска метаболических и психиатрических заболеваний.

Описанные полиморфные варианты гена *NR3C1* не единственные — есть и другие изменения гена ГР, которые сопровождаются относительной резистентностью или гиперчувствительностью к ГК и ассоциированы с изменением риска ССЗ, включая *TthIII*, *D401H*, *A714Q*, *F737L*, *F774S*, *V575G*, *D641V* и *G679S* [53]. Тем не менее их значение и фенотипы продолжают изучаться.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

ГК часто назначаются при различных состояниях, однако их терапевтическая эффективность ограничивается нежелательными побочными явлениями. При этом часть эффектов ГК реализуется через ядерный рецептор. Насколько известно на настоящий момент, полиморфные варианты гена ГР *NR3C1* ассоциированы с интенсивностью проявлений гиперкортицизма, обуславливая наблюдаемое разнообразие чувствительности к эндо- и экзогенным ГК, вариативность метаболических нарушений. Синдром гиперкортицизма является констелляцией, увеличивающей вероятность фатальных сердечно-сосудистых событий. В связи с чем изучение

вариаций гена ГР может помочь в раннем выявлении кардиометаболических нарушений, ССЗ и их прогнозировании.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Источники финансирования. Работа выполнена по инициативе авторов без привлечения финансирования.

Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с содержанием настоящей статьи.

Участие авторов. Бровкина С.С. — существенный вклад в концепцию исследования, получение и анализ данных, интерпретация результатов, написание статьи; Джериева И.С. — существенный вклад в концепцию исследования, внесение в рукопись существенной правки с целью повышения научной ценности статьи; Волкова Н.И. — существенный вклад в дизайн исследования, внесение в рукопись существенной правки с целью повышения научной ценности статьи; Шкурят Т.П. — существенный вклад в концепцию исследования, внесение в рукопись существенной правки с целью повышения научной ценности статьи; Гончарова З.А. — существенный вклад в дизайн исследования, внесение в рукопись существенной правки с целью повышения научной ценности статьи; Машкина Е.В. — существенный вклад в дизайн исследования, внесение в рукопись существенной правки с целью повышения научной ценности статьи; Решетников И.Б. — интерпретация результатов, написание статьи. Все авторы одобрили финальную версию статьи перед публикацией, выразили согласие нести ответственность за все аспекты работы, подразумевающую надлежащее изучение и решение вопросов, связанных с точностью или добросовестностью любой части работы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. Всемирная организация здравоохранения [интернет]. [World Health Organization] [доступ от 21.04.2022]. Доступно по: <https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/cardiovascular-diseases-cvds>. Ссылка активна на 10.01.2023.
2. Walker LE, Poltavskiy E, Janak JC, et al. US Military Service and Racial/Ethnic Differences in Cardiovascular Disease: An Analysis of the 2011–2016 Behavioral Risk Factor Surveillance System. *Ethn Dis*. 2019;29(3):451–462. doi: <https://doi.org/10.18865/ed.29.3.451>
3. Rice J, White A, Scarpati L, et al. Long-term Systemic Corticosteroid Exposure: A Systematic Literature Review. *Clin Ther*. 2017;39(11):2216–2229. doi: <https://doi.org/10.1016/j.clinthera.2017.09.011>
4. Sato A, Peacock M, Bellido T. Glucocorticoid Excess in Bone and Muscle. *Clin Rev Bone Miner Metab*. 2018;16(1):33–47. doi: <https://doi.org/10.1007/s12018-018-9242-3>
5. StatPearls [Internet]. Surmachevska N, Tiwari V. Corticosteroid Induced Myopathy. Treasure Island (FL): StatPearls Publishing; 2022 Jan. [cited 2022 Apr 12]. Available from: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK557731/>
6. Walker LE, Poltavskiy E, Janak JC, et al. Dexamethasone in Hospitalized Patients with Covid-19. *N Engl J Med*. 2021;384(8):693–704. doi: <https://doi.org/10.1056/NEJMoa2021436>
7. Haran M, Schattner A, Kozak N, et al. Acute steroid myopathy: a highly overlooked entity. *QJM An Int J Med*. 2018;111(5):307–311. doi: <https://doi.org/10.1093/qjmed/hcy031>
8. Lopez P, Nepal P, Akinlonu A, et al. Low Skeletal Muscle Mass Independently Predicts Mortality in Patients with Chronic Heart Failure after an Acute Hospitalization. *Cardiology*. 2019;142(1):28–36. doi: <https://doi.org/10.1159/000496460>
9. Sabatino A, Cuppari L, Stenvinkel P, et al. Sarcopenia in chronic kidney disease: what have we learned so far? *J Nephrol*. 2020;34(4):1347–1372. doi: <https://doi.org/10.1007/s40620-020-00840-y>
10. Canonica GW, Colombo GL, Bruno GM, et al. Shadow cost of oral corticosteroids-related adverse events: A pharmacoeconomic evaluation applied to real-life data from the Severe Asthma Network in Italy (SANI) registry. *World Allergy Organ J*. 2019;12(1):100007. doi: <https://doi.org/10.1016/j.waojou.2018.12.001>
11. Bénard-Larivière A, Pariente A, Pambrun E, et al. Prevalence and prescription patterns of oral glucocorticoids in adults: a retrospective cross-sectional and cohort analysis in France. *BMJ Open*. 2017;7(7):e015905. doi: <https://doi.org/10.1136/bmjopen-2017-015905>
12. Красивина И.Г., Долгова Л.Н., Долгов Н.В., Ларина А.А. Патогенез и профилактика глюкокортикоид-индуцированного остеопороза // Медицинский совет. — 2019. — №21. — С. 121–129. [Krasivina IG, Dolgova LN, Dolgov NV, Larina AA. Glucocorticoid-induced osteoporosis: pathogenesis and prevention. *Medical Council*. 2019;(21):126–134. (In Russ.)]. doi: <https://doi.org/10.21518/2079-701X-2019-21-126-134>
13. Varlamov E, Langlois F, Vila G, Fleseriu M. Management of endocrine disease: Cardiovascular risk assessment, thromboembolism, and infection prevention in Cushing's syndrome: a practical approach. *Eur J Endocrinol*. 2021;184(5):R207–R224. doi: <https://doi.org/10.1530/eje-20-1309>
14. Rosmond R, Holm G. A 5-year follow-up study of 3 polymorphisms in the human glucocorticoid receptor gene in relation to obesity, hypertension, and diabetes. *J Cardiometa Syndr*. 2008;3(3):132–135. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1559-4572.2008.00008.x>
15. Motavalli R, Majidi T, Pourlak T, et al. The clinical significance of the glucocorticoid receptors: Genetics and epigenetics. *J Steroid Biochem Mol Biol*. 2021;(213):105952. doi: <https://doi.org/10.1016/j.jsbmb.2021.105952>
16. Nicolaides NC. The human glucocorticoid receptor beta: From molecular mechanisms to clinical implications. *Endocrinology*. 2022;163(11). doi: <https://doi.org/10.1210/endo/bqac150>
17. Lu N, Collins J, Grissom S, Cidlowski J. Selective regulation of bone cell apoptosis by translational isoforms of the glucocorticoid receptor. *Mol Cell Biol*. 2007;27(20):7143–7160. doi: <https://doi.org/10.1128/mcb.00253-07>

18. Kino T, Su YA, Chrousos GP. Human glucocorticoid receptor isoform β : recent understanding of its potential implications in physiology and pathophysiology. *Cell Mol Life Sci*. 2009;66(21):3435-3448. doi: <https://doi.org/10.1007/s00018-009-0098-z>
19. Lewis-Tuffin LJ. The physiology of human glucocorticoid receptor beta (hgrbeta) and glucocorticoid resistance. *Ann NY Acad Sci*. 2006;1069(1):1-9. doi: <https://doi.org/10.1196/annals.1351.001>
20. Webster JC, Oakley RH, Jewell CM, Cidlowski JA. Proinflammatory cytokines regulate human glucocorticoid receptor gene expression and lead to the accumulation of the dominant negative β isoform: A mechanism for the generation of glucocorticoid resistance. *Proc Natl Acad Sci*. 2001;98(12):6865-6870. doi: <https://doi.org/10.1073/pnas.121455098>
21. Ramos-Ramírez P, Tliba O. Glucocorticoid receptor β (GR β): Beyond its dominant-negative function. *Int J Mol Sci*. 2021;22(7):3649. doi: <https://doi.org/10.3390/ijms22073649>
22. Kino T, Manoli I, Kelkar S, et al. Glucocorticoid receptor (GR) β has intrinsic, GR α -independent transcriptional activity. *Biochem Biophys Res Commun*. 2009;381(4):671-675. doi: <https://doi.org/10.1016/j.bbrc.2009.02.110>
23. Hinds T, Peck B, Shek E, et al. Overexpression of glucocorticoid receptor β enhances myogenesis and reduces catabolic gene expression. *Int J Mol Sci*. 2016;17(2):232. doi: <https://doi.org/10.3390/ijms17020232>
24. DuBois D, Sukumaran S, Jusko W, Almon R. Evidence for a glucocorticoid receptor beta splice variant in the rat and its physiological regulation in liver. *Steroids*. 2013;78(2):312-320. doi: <https://doi.org/10.1016/j.steroids.2012.11.014>
25. Marino JS, Stechschulte LA, Stec DE, et al. Glucocorticoid Receptor β Induces Hepatic Steatosis by Augmenting Inflammation and Inhibition of the Peroxisome Proliferator-activated Receptor (PPAR) α . *J Biol Chem*. 2016;291(50):25776-25788. doi: <https://doi.org/10.1074/jbc.M116.752311>
26. Kino T. Single Nucleotide Variations of the human GR gene manifested as pathologic mutations or polymorphisms. *Endocrinology*. 2018;159(7):2506-2519. doi: <https://doi.org/10.1210/en.2017-03254>
27. Lengton R, Iyer AM, Valk ES, et al. Variation in glucocorticoid sensitivity and the relation with obesity. *Obes Rev*. 2022;23(3). doi: <https://doi.org/10.1111/obr.13401>
28. Ensembl.org [Internet]. rs41423247 (SNP) — Population genetics — Homo_sapiens — Ensembl genome browser 106. [cited 2022 Apr 12]. Available from: https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Population?db=core;r=5:143398510-143399510;v=rs41423247;vdb=variation;vf=170723002
29. Weaver J, Hitman G, Kopelman P. An association between a BclI restriction fragment length polymorphism of the glucocorticoid receptor locus and hyperinsulinaemia in obese women. *J Mol Endocrinol*. 1992;9(3):295-300. doi: <https://doi.org/10.1677/jme.0.0090295>
30. Rosmond R, Holm G. A 5-year follow-up study of 3 polymorphisms in the human glucocorticoid receptor gene in relation to obesity, hypertension, and diabetes. *J Cardiomatol Syndr*. 2008;3(3):132-135. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1559-4572.2008.00008.x>
31. Giordano R, Marzotti S, Berardelli R, et al. BclI polymorphism of the glucocorticoid receptor gene is associated with increased obesity, impaired glucose metabolism and dyslipidaemia in patients with Addison's disease. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2012;77(6):863-870. doi: <https://doi.org/10.1111/j.1365-2265.2012.04439.x>
32. Tremblay A, Bouchard L, Bouchard C, et al. Long-term adiposity changes are related to a glucocorticoid receptor polymorphism in young females. *J Clin Endocrinol Metab*. 2003;88(7):3141-3145. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2002-021521>
33. Geelen CC, van Greevenbroek MM, van Rossum EF, et al. Bcl I glucocorticoid receptor polymorphism is associated with greater body fatness: The hoorn and CODAM studies. *J Clin Endocrinol Metab*. 2013;98(3):E595-E599. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2012-3442>
34. Barat P, Corcuff J, Tauber M, Moisan M. Associations of glucocorticoid receptor and corticosteroid-binding globulin gene polymorphisms on fat mass and fat mass distribution in prepubertal obese children. *J Physiol Biochem*. 2012;68(4):645-650. doi: <https://doi.org/10.1007/s13105-012-0176-9>
35. Kaymak CM, Karabulut HG, Yürür Kutlay N, et al. Association between N363S and BclI polymorphisms of the glucocorticoid receptor gene (NR3C1) and glucocorticoid side effects during childhood acute lymphoblastic leukemia treatment. *Turkish J Hematol*. May 2017;151-158. doi: <https://doi.org/10.4274/tjh.2016.0253>
36. Zawiejska A, Bogacz A, Kciek R, et al. A 646C & G (rs41423247) polymorphism of the glucocorticoid receptor as a risk factor for hyperglycaemia diagnosed in pregnancy—data from an observational study. *Acta Diabetol*. 2022;59(2):259-267. doi: <https://doi.org/10.1007/s00592-021-01799-3>
37. Ensembl.org [Internet]. rs56149945 (SNP) — Population genetics — Homo_sapiens — Ensembl genome browser 106. [cited 2022 Apr 12]. Available from: https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Population?db=core;r=5:143399252-143400252;v=rs56149945;vdb=variation;vf=170863546
38. Huizenga N. A polymorphism in the glucocorticoid receptor gene may be associated with an increased sensitivity to glucocorticoids in vivo. *J Clin Endocrinol Metab*. 1998;83(1):144-151. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.83.1.144>
39. Di Blasio A, Van Rossum E, Maestrini S, et al. The relation between two polymorphisms in the glucocorticoid receptor gene and body mass index, blood pressure and cholesterol in obese patients. *Clin Endocrinol (Oxf)*. 2003;59(1):68-74. doi: <https://doi.org/10.1046/j.1365-2265.2003.01798.x>
40. Rosmond R. Tsp509I polymorphism in exon 2 of the glucocorticoid receptor gene in relation to obesity and cortisol secretion: cohort study. *BMJ*. 2001;322(7287):652-653. doi: <https://doi.org/10.1136/bmj.322.7287.652>
41. Dobson M. The N363S Polymorphism of the glucocorticoid receptor: potential contribution to central obesity in men and lack of association with other risk factors for coronary heart disease and diabetes mellitus. *J Clin Endocrinol Metab*. 2001;86(5):2270-2274. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.86.5.2270>
42. Marti A, Ochoa MC, Sánchez-Villegas A, et al. Meta-analysis on the effect of the N363S polymorphism of the glucocorticoid receptor gene (GRL) on human obesity. *BMC Med Genet*. 2006;7(1):50. doi: <https://doi.org/10.1186/1471-2350-7-50>
43. Savas M, Wester V, van der Voorn B, et al. Anthropometrics and metabolic syndrome in relation to glucocorticoid receptor polymorphisms in corticosteroid users. *Neuroendocrinology*. 2020;111(11):1121-1129. doi: <https://doi.org/10.1159/000513703>
44. Wester V, Koper J, van den Akker E, et al. Glucocorticoid receptor haplotype and metabolic syndrome: the Lifelines cohort study. *Eur J Endocrinol*. 2016;175(6):645-651. doi: <https://doi.org/10.1530/eje-16-0534>
45. Ensembl.org [Internet]. rs6189 (SNP) — Population genetics — Homo_sapiens — Ensembl genome browser 106. [cited 2022 Apr 12]. Available from: https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Population?db=core;r=5:143400274-143401274;v=rs6189;vdb=variation;vf=164781486
46. van Rossum E, Koper J, Huizenga N, et al. A Polymorphism in the glucocorticoid receptor gene, which decreases sensitivity to glucocorticoids in vivo, is associated with low insulin and cholesterol levels. *Diabetes*. 2002;51(10):3128-3134. doi: <https://doi.org/10.2337/diabetes.51.10.3128>
47. van Rossum E, Voorhoeve P, te Velde S, et al. The ER22/23EK polymorphism in the glucocorticoid receptor gene is associated with a beneficial body composition and muscle strength in young adults. *J Clin Endocrinol Metab*. 2004;89(8):4004-4009. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2003-031422>
48. van Rossum E, Feelders R, van den Beld A, et al. Association of the ER22/23EK polymorphism in the glucocorticoid receptor gene with survival and C-reactive protein levels in elderly men. *Am J Med*. 2004;117(3):158-162. doi: <https://doi.org/10.1016/j.amjmed.2004.01.027>
49. Kuningas M, Mooijaart S, Slagboom P, et al. Genetic variants in the glucocorticoid receptor gene (NR3C1) and cardiovascular disease risk. The Leiden 85-plus study. *Biogerontology*. 2006;7(4):231-238. doi: <https://doi.org/10.1007/s10522-006-9021-2>
50. Finken M, Meulenbelt I, Dekker F, et al. The 23K variant of the r23k polymorphism in the glucocorticoid receptor gene protects against postnatal growth failure and insulin resistance after preterm birth. *J Clin Endocrinol Metab*. 2007;92(12):4777-4782. doi: <https://doi.org/10.1210/jc.2007-1290>
51. Bertalan R, Patócs A, Boyle B, et al. The protective effect of the ER22/23EK polymorphism against an excessive weight gain during pregnancy. *Gynecol Endocrinol*. 2009;25(6):379-382. doi: <https://doi.org/10.1080/09513590902730762>

52. Ensembl.org [Internet]. rs6198 (SNP) — Population genetics — Homo_sapiens — Ensembl genome browser 106. [cited 2022 Apr 12]. Available from: https://www.ensembl.org/Homo_sapiens/Variation/Population?db=core;r=5:143277556-143278556;v=rs6198;vdb=variation;vf=164781912
53. Liu B, Zhang T, Knight J, Goodwin J. The Glucocorticoid Receptor in Cardiovascular Health and Disease. *Cells*. 2019;8(10):1227. doi: <https://doi.org/10.3390/cells8101227>
54. Müller L, Kienitz T, Deutschbein T, et al. Glucocorticoid receptor polymorphisms influence muscle strength in cushing's syndrome. *J Clin Endocrinol Metab*. 2019;105(1):305-313. doi: <https://doi.org/10.1210/clinem/dgz052>
55. Volaklis K, Halle M, Meisinger C. Muscular strength as a strong predictor of mortality: A narrative review. *Eur J Intern Med*. 2015;26(5):303-310. doi: <https://doi.org/10.1016/j.ejim.2015.04.013>
56. Roerink S, Wagenmakers M, Smit J, et al. Glucocorticoid receptor polymorphisms modulate cardiometabolic risk factors in patients in long-term remission of Cushing's syndrome. *Endocrine*. 2016;53(1):63-70. doi: <https://doi.org/10.1007/s12020-016-0883-z>
57. Rodrigues DM, Reis RS, Dalle Molle R, et al. Decreased comfort food intake and allostatic load in adolescents carrying the A3669G variant of the glucocorticoid receptor gene. *Appetite*. 2017;116(6):21-28. doi: <https://doi.org/10.1016/j.appet.2017.04.004>

Рукопись получена: 05.08.2022. Одобрена к публикации: 09.11.2022. Опубликовано online: 28.02.2023.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ [AUTHORS INFO]

***Бровкина Снежана Сергеевна [Snezhana S. Brovkina, MD]**; адрес: 344022, Ростов-на-Дону, пер. Нахичеванский, 29 [address: 29, Nakhichevansky Lane, Rostov-on-Don, 344022, Russia]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-2486-5223>; SPIN-код: 3059-0330-код; e-mail: snegka12345@ya.ru

Джериева Ирина Саркисовна, д.м.н., доцент [Irina S. Dzherieva, MD, PhD, Associate Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3002-9595>; SPIN-код: 1359-1819; e-mail: dgerieva@yandex.ru

Волкова Наталья Ивановна, д.м.н., профессор [Natalya I. Volkova, MD, PhD, Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-4874-7835>; SPIN-код: 3146-8337; e-mail: n_i_volkova@mail.ru

Шкурат Татьяна Павловна, д.б.н., профессор [Tatiana P. Shkurat, Doctor of Biology, Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-6197-7374>; SPIN-код: 5620-2091; e-mail: tshkurat@yandex.ru

Гончарова Зоя Александровна, д.м.н., профессор [Zoya A. Goncharova, MD, PhD, Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-7093-9548>; SPIN-код: 1422-4904; e-mail: centrms@mail.ru

Машкина Елена Владимировна, д.б.н., доцент [Elena V. Mashkina, Doctor of Biology, Associate Professor]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-4424-9508>; SPIN-код: 3010-1500; e-mail: lenmash@mail.ru

Решетников Игорь Борисович [Igor B. Reshetnikov, MD]; ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-3445-322X>; SPIN-код: 4320-2716; e-mail: Reshetnikov_ib@rostgmu.ru

ЦИТИРОВАТЬ:

Бровкина С.С., Джериева И.С., Волкова Н.И., Шкурат Т.П., Гончарова З.А., Машкина Е.В., Решетников И.Б. Ассоциация структуры глюкокортикоидного рецептора и полиморфных вариантов гена *NR3C1* с метаболическими нарушениями // *Проблемы эндокринологии*. — 2023. — Т. 69. — №1. — С. 50-58. doi: <https://doi.org/10.14341/probl13160>

TO CITE THIS ARTICLE:

Brovkina SS, Dzherieva IS, Volkova NI, Shkurat TP, Goncharova ZA, Mashkina EV, Reshetnikov IB. Association of the structure of the glucocorticoid receptor and single nucleotide NR3C1 gene polymorphisms with metabolic disorders. *Problems of Endocrinology*. 2023;69(1):50-58. doi: <https://doi.org/10.14341/probl13160>